

MH
38

Sa 3m

HERBARIUM COPY



HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY

OF THE

GRAY HERBARIUM

Received

Bought

Rebound April 12, 1955

MONOGRAPHIA

GENERVM

ALOES ET MESEMBRYANTHEMI

AVCTORE

JOSEPHO PRINCIPE DE SALM-REIFFERSCHEID-DYCK

BONNAE 1836—1863

APVD MAXIMILIANVM COHEN ET FILIVM

for annotated index to this work, see,
reprint from *Curtius* Journ. vol. 7 on shelf with this.

MANUFACTURED IN U.S.A.

100%

100% POLYESTER FIBERGLASS YARN

8028
P28.2

CONSPECTUS

FASCICULI PRIMI.

Aloae

	§.	Fig.
1. spiralis	1	5
2. foliolosa	2	4
3. viscosa	3	3
4. viscosa indurata . .	3	3β .
5. subtortuosa	3	5
6. torquata	3	6
7. subrigida	4	1
8. rigida	4	3
9. rigida expansa . .	4	3β .
10. granata minor . .	6	6β .
11. attenuata clariperla	6	12β .
12. Reinwardti	6	16
13. coarctata	6	17
14. scabra	7	1
15. recurva	7	3
16. tessellata	8	1
17. parva	8	2
18. mirabilis	9	1
19. asperula	9	2
20. autilinea	11	3
21. setosa	12	3
22. chloracantha . .	13	1
23. stenophylla	13	2
24. Bowiea	14	1

Mesembryanthema

	§.	Fig.
1. obconellum	1	3
2. multipunctatum . .	3	6
3. rostratum	3	7
4. rostratum brevibrac-		
teatum	3	7β .
5. tigrinum	3	1
6. felinum	5	2
7. mustellinum	5	5
8. ermininum	5	6
9. musculinum	5	7
10. scapiger	6	1
11. semicylindricum . .	7	2
12. difforme	7	3
13. acutum. . . .	13	1
14. tricolorum	15	7
15. validum	15	8
16. geminiflorum . . .	17	4
17. clavellatum	18	1
18. crassifolium	18	3
19. aequilaterale . . .	19	1
20. virescens. . . .	19	3
21. aurantiacum	25	2
22. aureum	25	3
23. falciforme	29	1
24. lunatum	29	3
25. forficatum	31	1
26. scindendatum . . .	33	5
27. Haworthii	40	1
28. corallinum	30	3 — ?
29. stipulaceum	40	3
30. spiniforme	47	1
31. curvifolium	47	2
32. aduncum	47	3
33. filicaule	47	4
34. expansum. . . .	62	2
35. relaxatum	63	1
36. palleus	63	2

A L O A R U M C O N S P E C T U S.

Tabula synoptica Sectionum.

ALOÆ	Parviflora.	Limbo regulari	APICRA Haw.	§. 1. Imbricatae. §. 2. Foliolosae.
		revoluto . . . HAWORTHIA Duval.		
Grandiflora.	Tubo recto	Limbo bilabiato		§. 3. Triquetrae. §. 4. Tortuosae. §. 5. Albicantes. §. 6. Margaritiferae. §. 7. Luridae. §. 8. Tessellatae. §. 9. Retusae. §. 10. Reticulatae. §. 11. Limpidae. §. 12. Setatae. §. 13. Loratae.
		patulo	BOWIEA Haw.	
Grandiflora.	Tubo recto	Segmentis exterioribus plus minusve liberis	Stamina inclusa . . . ALOE Haw.	§. 14. Bowieae. §. 15. Echinatae. §. 16. Proliferae. §. 17. Rhodacanthae. §. 18. Submaculatae. §. 19. Paniculatae. §. 20. Serrulatae. §. 21. Microcanthae. §. 22. Purpurascentes. §. 23. Pictæ. §. 24. Mitraeformes. §. 25. Fruticulosae. §. 26. Arborescentes.
		Segmentis exterioribus ad apices usque coalitis	RHIPIDODENDRON W.	
	Tubo curvato		GASTERIA Duval.	§. 27. Pachidendra. §. 28. Rhipidodendra. §. 29. Gasteriae.

MESEMBRYANTHEMORUM CONSPECTUS.

Tabula synoptica Sectionum.

MESEMBRYANTHEMIA

Epapulosa.

Caule erecto aut prostrato

Foliis teretibus aut semiteretibus

Foliis planis

Caule nullo aut brevissimo I. Subacaulia

distinctis aut
subdistinctis II. Triquetra

vaginato-econnatis. III. Perfoliata

Foliis teretibus aut semiteretibus IV. Teretuscula

V. Papillosa

VI. Planifolia

- §. 1. Sphaeroidea.
- §. 2. Subquadrifolia.
- §. 3. Rostrata.
- §. 4. Aloidea.
- §. 5. Ringentia.
- §. 6. Dolabriiformia.
- §. 7. Diformia.
- §. 8. Linguaeformia.
- §. 9. Gibbosa.
- §. 10. Calamiformia.
- §. 11. Teretifolia.
- §. 12. Bellidiflora.
- §. 13. Acuta.
- §. 14. Macrorhiza.

- §. 15. Corniculata.
- §. 16. Pugioniformia.
- §. 17. Sarmentosa.
- §. 18. Reptantia.
- §. 19. Acinaciformia.
- §. 20. Rubricaulia.
- §. 21. Heteropetala.
- §. 22. Bracteata.
- §. 23. Virgata.
- §. 24. Virentia.
- §. 25. Aurea.
- §. 26. Blanda.
- §. 27. Amöna.
- §. 28. Pallidiflora.
- §. 29. Faleata.
- §. 30. Deltoidea.
- §. 31. Forficata.

- §. 32. Geminata.
- §. 33. Uncinata.
- §. 34. Microphylla.
- §. 35. Rostellata.
- §. 36. Vaginata.
- §. 37. Tumidula.
- §. 38. Crocea.

- §. 39. Veruculata.
- §. 40. Haworthiana.
- §. 41. Spinoso.
- §. 42. Cymbaeformia.
- §. 43. Defoliata.
- §. 44. Splendentia.
- §. 45. Juncea.
- §. 46. Tenuifolia.
- §. 47. Adunca.

- §. 48. Scabrida.
- §. 49. Trichotoma.
- §. 50. Aspericaulia.
- §. 51. Hispida.
- §. 52. Barbata.
- §. 53. Echinata.
- §. 54. Spinulifera.
- §. 55. Moniliformia.
- §. 56. Crassulina.
- §. 57. Geniculiflora.
- §. 58. Nodiflora.

- §. 59. Scaposa.
- §. 60. Platiphylla.
- §. 61. Cordifolia.
- §. 62. Expansa.
- §. 63. Relaxata.
- §. 64. Tripolia.
- §. 65. Helianthoidea.



A. spiralis.

(§. 1.—Fig. 5.)

(§. 1. Fig. 5.)

ALOE SPIRALIS Haw.

(*APICRA Haw.*)

ALOE spiralis; caulescens, foliis spiraliter quinquefariis erecto - patentibus lanceolato-acuminatis viridibus, subtus punctis sub prominulis albis, apice inaequilateri-triquetris, perianthiis ad angulos laevibus.

A. spiralis; foliis praespiralibus quinquefariis patentibus ovato-acuminatis glabris viridibus, apicem versus carina semilateralis; subtus superne obsolete sparsim maculatis; marginibus asperiusculis. *Haw. Synop.* p. 97. — *Schult. Syst.* 7. p. 659. — *Al. pentagona* β. *spiralis* Nob. *Cat. rais.* p. 10.

APICRA spiralis; caulescens tortuosa, foliis quinquefariis patentibus spiralibus glabris, subtus obsolete maculatis. *Willd. Mag.* p. 273. No. 21. (excl. *Synon. Lin. Sp. pl.*)

RADIX cylindracea, carnosa, fibrosa.

CAULIS subpedalis, strictus, plerumque simplex, foliis tectus.

FOLIA conferta, quinquangulatim disposita, angulis spiraliter caulem ambientibus, poll. 2 longa et lin. 9 basi lata, subpatentia, stricta, rigida, acuta, pungentia; supra planiuscula viridia, subtus convexa punctisque sub prominulis albis adspersa; apicem versus inaequateri-carinata aut bicarinata, ad margines carinasque crenulata.

PEDUNCULUS floralis sesquipedalis plerumque simplex, crassiusculus, nudus, livide-glaucescens.

FLORES spicati, erecti, brevissime pedicellati. Bracteae lanceolatae pedicello longiores.

PERIANTHIUM tubulosum, cylindraceo-hexagonum, viridulum, angulis laevibus, limbo regulari patulo, expanso; laciniae obtusae, erosulae, albo-viridulae.

STAMINA perianthii tubum subaequantia, alternatim inaequalia. Filamenta subulata, flavidantia. Antherae parvae, luteae.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceo-trigonum. Stylus flavidus, filamenta breviora adaequans. Stigma simplex, subglobosum.

CAPSULA matura trigona, superne attenuata.

Habitat in Prom. b. spei. Floret aestate.

Observ. Haec species, a cl. Haworth primo descripta, veteribus botanicis ignota est, et synonyma antiquae *Al. spiralis* ad *Al. imbricatam* referenda sunt. Proxime accedit ad *Al. pentagonam*, a qua differt statura majore, et angulis spiraliter tortis. Sobiles ad basin plantae raro enascuntur.



A. foliolosa.

(S. 2. — Fig. 4.)

ALOE FOLIOLOSA Haw.
(APICRA Haw.)

ALOE foliolosa; caulescens, foliis spiraliter quinquesariis confertis patentissimis orbiculato-ovatis acutis rigidis laevibus nitidis, supra planis, subtus convexiusculis imo apice oblique carinatis, ad margines carinamque cartilagineo-crenulatis.

HAWORTHIA foliolosa; foliis multifariis brevissimis confertissimis orbiculato-ovatis laevigatis horizontalibus laete viridibus. *Haw. Synop. p. 99. — Nob. Cat. rais. p. 9. (Sub Aloe.)*

APICRA foliolosa; caulescens stricta, foliis multifariis patentibus orbiculato-ovatis carinatis acutis, margine carinaque incrassatis apice recurvis, glabris. *Willd. Mag. p. 274. No. 28.*

ALOE foliolosa; foliis multifariis brevissimis orbiculato-ovatis laevigatis horizontalibus laete-viridibus, caule stricto. *Haw. Trans. Linn. Soc. 7. p. 7. Ait. Kew. ed. 2. Vol. 2. p. 298. — Bot. Mag. t. 1352. — Schult. Syst. 7. p. 656.*

RADIX cylindracea, carnosa, fibrosa.

CAULIS pedalis et ultra, strictus, foliis tectus, basi prolifer.

FOLIA confertissima, quinquesariam in linea dense spirali disposita, lineas 7—8 longa et totidem medio lata, basi angustiora apice acuta; juniora erecto-patentia, seniora patentissima, stricta, perviridia, crassiuscula, rigida, laevissima, nitida; supra plana apice subcanaliculata, subtus convexa apice inaequilateri-carinata, ad margines et ad carinam laevissime incrassata, cartilaginea, obsolete crenulata.

PEDUNCULUS floralis simplex, bracteis quibusdam sterilibus inferne instructus, sordide violaceus.

FLORES dense subspicati, erecti, breve pedicellati. Bracteae violaceae pedicellum adaequantes.

PERANTHIMUM tubulosum cylindraceo-hexagonum, viridulum, angulis rotundatis, limbo regulari brevissimo, patulo, expanso; laciniae obtusae, albidae, linea media viridi notata.


STAMINA perianthii tubum adaequantia, alternatim inaequalia. Filamenta subulata virescentia. Antherae flavae.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceo-trigonum. Stylus filamenta breviora adaequans. Stigma obtusum.

CAPSULA matura parvula, cylindraceo-trigona.

Habitat in Prom. b. spei. — Floret aestate.

Observ. A cl. Masson advecta fuit anno 1795 in Angliam haec pulchra species, quae ab *Al. aspera* foliis laevissimis atque densissime confertis omnino differt. Propagatur sobolibus ad basin plantae satis frequentibus. Variat quandoque foliis paulum longioribus, et ergo minus orbiculatis.





A. viscosa.

(§. 3. — Fig. 3.)

ALOE VISCOSA Lin.

(*HAWORTHIA Duval.*)

ALOE viscosa; caulescens prismatica, foliis trifariam imbricatis erecto - recurvulis ovatis luride atroviridibus, supra excavatis, subtus valde carinato-compressis, utrimque et ad margines laevissime rugosis.

HAWORTHIA viscosa; foliis trifariis ovatis acutis perviridibus minime tuberculatis, caulis strictis simplicibus. *Haw. Synop.* p. 90. — *Haw. Trans. Lin. Soc.* 7. p. 6. — *Nob. Cat. rais.* p. 8. (excl. var. β.) — *Schult. Syst.* 7. p. 652. (Sub. *Aloe.*)

APICRA viscosa; caulescens stricta, foliis trifariis, erecto-patentibus, ovatis, trigono-carinatis, acutis, supra concavis, glabris. *Willd. Mag.* p. 274. No. 25.

ALOE viscosa; subcaulescens; foliis imbricatis, trifariis, ovatis; floribus racemosis, cernuis, cylindricis. *Thunb. Diss.* No. 13. — *Ait. Kew. ed. 1. Vol. 1.* p. 470. — *DC. Pl. grass.* t. 16. — *Willd. sp. pl. 2.* p. 191. — *Ait. Kew. ed. 2. vol. 2.* p. 299. — *Bot. Mag.* t. 814. — *Willd. Enum.* p. 384.

ALOE viscosa; floribus sessilibus infundibuliformibus bilabiatis: laciniis quinque revolutis: summa erecta. *Lin. Sp. pl. Holm.* 1. p. 322. — *Mill. Dict.* No. 11. — *Knorr. Del.* 1. t. A. 10.

ALOE foliis canaliculatis, trifariam imbricatis, caulinis apice reflexo-patulis. *Lin. Hort. Cliff. Hort.* p. 132. *Hort. Ups.* 87. — *Royen. Lugd. bat.* 23.

ALOE africana erecta triangularis et triangulari folio viscoso. *Comm. Prael.* 82. t. 31. — *Dill. Elth. t. 13. fig. 13.* — *Till. Hort. Pis.* p. 7. — *Boerh. Ind. atl. Pl.* 2. p. 131.

ALOE triangularis. *Lam. Encyc.* p. 89. No. 18. — *Medik. Bot. Beob.* p. 61.

RADIX cylindracea, carnosa, fibrosa.

CAULIS poll. 6-12 altus, strictus, basi et superne ramosus, foliis tectus.

FOLIA plus minusve conferta, trifariam imbricata, prisma lateribus planiusculis formantia, erecto-recurvula, pollicem et ultra longa et lin. 5-6 medio lata, basi paulum angustiora apice acuta, luride-perviridia, macra, rigida utrimque rugulosa; supra excavata, subtus lateraliter compressa lateribus convexiusculis, acute carinata; ad margines apicemque carinae cartilaginea, integerrima.

PEDUNCULUS floralis simplex, filiformis, nudus, cinereo-roseus.

FLORES laxe racemosi, patentes, longe pedicellati. **Bractae parvulae**, pedicello multo breviores.

PERIANTHUM ad $\frac{2}{3}$ tubulosum, obclavatum, album pallideviridi striatum, limbo bilabiato, labii binis revolutis; lacimiae albidae basi viridulae, obtusae, linea media fusca notatae, exterioribus planioribus et brevioribus, interioribus (summa erectiuscula latiuscula) canaliculatis, undulatis.


STAMINA perianthii tubo breviora, alternatim inaequalia. **Filamenta subulata albida.** Antherae flavae.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceo - trigonum. **Stylus filamenta breviora ad-aequans.** **Stigma obtusum.**

CAPSULA matura elongata, cylindraceo - trigona.

Habitat in Aethiopia et in Prom. b. spei. — Floret aestate.

Observ. In plantis spontaneis, sed raro in cultis, folia viscosa sunt, et inde nomen huic speciei tributum. Varietates β & γ quos cl. Haworth *Al. viscosae* adscripsit (*Revis. p. 49.*) non constantes se praebent, et meri vegetationis casus esse videntur. Ab *Al. asperiuscula* et *cordifolia* differt caule elatiore, et foliis macris, excavatis, magisque imbricatis. Sobolibus ramisque frequentibus facilime propagatur.





A. viscosa indurata.

(§.3.—Fig. 3.β.)

(§. 3. Fig. 3. β.)

ALOE VIScosa indurata Nob.

ALOE viscosa β. *indurata*; foliis lanceolato-ovatis crassioribus, laxius trifariam imbricatis.

HAWORTHIA indurata; ramulosa: foliis trifariis patulis compresso-cavis cordato-acuminatis asperis atro-viridibus induratissimis; senectis recurvo-expansis unisulcatis crassioribus. *Haw. Revis. p. 49.* — *Schult. Syst. 7. p. 654.* (sub *Aloe*.)


RADIX; ut in *Al. viscosa*.


CAULIS spithameus, strictus, basi prolifer, foliis tectus.

FOLIA remotiuscula, laxe trifariam imbricata, prisma lateribus convexiusculis formantia, erecto-patula, sesquipollicem longa et lin: 6 - 9 medio lata, apicem versus supra incassata et subtus carinato-compressa.

PEDUNCULUS, FLORES, PERIANTHUM, STAMINA, PISTILLUM, CAPSULA; ut in specie.

Observ. Haec planta ab *Al. viscosa* non satis mihi differre videtur, ut pro specie legitima habenda sit. Hybridam potius prolem puto, e secundatione *Al. viscosae* et *cordifoliae* ortam, quae foliis crassioribus, et inde minus dense imbricatis, a prima solum recedit. Meretur nihilominus iconem propriam.







A. subtortuosa.

(§. 3. — Fig. 5.)

ALOE SUBTORTUOSA Schult.
(HAWORTHIA Duval.)

ALOE subtortuosa; caulescens, foliis subspiraliter trifariam imbricatis patent-recurvulis ovato-acutis luride atroviridibus, supra excavatis subtus valde carinato-compressis, utrimque rugulosis, ad margines laevibus.

APICRA tortuosa; caulescens tortuosa, foliis trifariis spiralibus imbricatis patulis, ova-tis trigono-carinatis, acutis, apice subreflexis, supra concavis, glabris. *Willd. Mag.* p. 274. Nr. 26.

ALOE pseudo-tortuosa: *Nob. Cat. rais.* p. 8.

HAWORTHIA pseudo-tortuosa *Haw. Suppl.* p. 59.

ALOE subtortuosa *Schult. Syst.* 7. p. 654.

RADIX cylindracea, carnosa, fibrosa.

CAULIS semipedalis, erectus, basi et quandoque superne ramosus, foliis tectus.

FOLIA conferta, dense trifariam imbricata, prisma subspirale lateribus planiusculis formantia, patentia, recurvula, sesquipolligem longa et lin. 9-11 medio lata, basi paulum angustiora apice acuta, luride perviridia, crassiuscula, rigida utrimque granulato-rugulosa, supra excavata, subtus lateraliter compressa lateribus superne concaviusculis, acute carinata; ad margines apicemque carinae cartilaginea, integerrima.

PEDUNCULUS floralis simplex, filiformis, nudus, roseo-cinereus.

FLORES laxe racemosi, patentes, longe pedicellati. Bracteae parvulae, pallidae, pedicello multo breviores.

PERIANTHIUM ad 2/3 tubulosum, obclavatum, albidum pallide viridi striatum, limbo bilabiato, labiis binis revolutis; lacinia albidae basi viridulae, obtusae, linea media fusca notatae, exterioribus planioribus et brevioribus, interioribus (summa latiuscula) canaliculatis, undulatis.

STAMINA perianthii tubo breviora, alternatim inaequalia. Filamenta subulata, virescentia. Antherae flavae.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceo-trigonum. Stylus filamenta breviora adaequans. Stigma obtusum.

CAPSULA matura elongata, cylindraceo-trigona.

Habitat in Prom. b. spei. Floret aestate.

Observ. Haec est planta quam cl. Willdenow pro *Al. tortuosa* habuit, et cui ideo nomen *Al. pseudo-tortuosae* imposui. E tempore Dillenii in hortis culta, et cum *Al. viscosa* commutata videtur. Ad hanc speciem revera characteribus, e flore sumptis, omnino accedit; sed ab illa valde differt foliis patentibus, caulem humiliorem spiraliiter ambientibus. Sobolibus satis frequentibus facile propagatur.



A. torquata.

(§. 5. — Fig. 6.)

(§. 3. Fig. 6.)

ALOE TORQUATA Haw.

(*HAWORTHIA Duval.*)

ALOE *torquata*; caulescens, foliis spiraliter subimbricato-trifariis erecto-recurvulis lanceolato-acuminatis luride viridibus, supra canaliculatim excavatis, subtus carinato-compressis, utrinque rugosis ad margines carinamque crenulatis.

HAWORTHIA *torquata*; foliis trifariis subpatulo-recurvulis sordide viridibus asperiusculis; caule torquato. *Haw.* in *Phil. Mag. et Ann.* 1827. p. 123. — *Schult. Syst.* 7. p. 654. (*sub Aloe.*)

RADIX cylindracea, carnosa, fibrosa.

CAULIS poll. 6-10 altus erectus basi et rarissime superne ramosus, foliis tectus.

FOLIA conferta, trifariam in linea spirali subimbricata, suberecto-patentia, recurvula, poll. 2 longa et lin. 6-7 medio lata, basi paulum angustiora apice cuspidato-acuta, luride perviridia, crassiuscula, rigida, utrinque granulatim rugosa, supra canaliculatim excavata, subtus convexa apicem versus lateraliter compressa, acute carinata; ad margines carinamque cartilaginea, subcrenulata.

PEDUNCULUS floralis simplex, filiformis, nudus, roseo-cinereus.

FLORES laxe racemosi, patentes, longe pedicellati. Bracteae parvulae, pallidae, pedicello multo breviores.

PERIANTHUM ad $\frac{2}{3}$ tubulosum, obclavatum, albidum, pallide viridi striatum, limbo bilabiato labiis binis revolutis; laciniae albidae basi viridulae, obtusae, linea media fusca notatae, exterioribus planioribus et brevioribus, interioribus (summa latiuscula) canaliculatis, undulatis.


STAMINA perianthii tubo breviora, alternatim inaequalia. Filamenta subulata viridula. Antherae flavae.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceo-trigonum. Stylus filamenta fere adaequans. Stigma obtusum.

CAPSULA matura elongata, cylindraceo-trigona.

Habitat in Prom. b. spei. Floret aestate.

Observ. Hanc plantam, quam primo pro varietate *elongata* *Al. subtortuosa* habui, floribus non minus ad *Al. viscosa* accedit. Cl. Haworth illam recenter sub nomine *Al. torquatae* descriptis, et revera ab *Al. subtortuosa* differt caule clatiore, foliis lanceolato-acuminatis, elongatis, in linea dense spirali dispositis et ad margines crenulatis. Hisce characteribus forte sectioni *Al. Tortuosarum* adscribenda foret haec species; melius attamen ad finem *Triquetrarum* sectionis locatam censeo. Sobolibus frequentibus facile propagatur.





A. subrigida.

(S. 4. — Fig. 4.)

ALOE SUBRIGIDA Schult.*(HAWORTHIA Dwul.)*

ALOE subrigida; caulescens, foliis spiraliter subimbricato-trifariis erecto-recurvis anguste lanceolato-acuminatis laeteviridibus, supra canaliculatis, subtus convexis apice carinatim compressis, utrinque et ad margines tuberculato-scabridis.

ALOE pseudo-rigida; foliis spiraliter trifariis cuspidatis patentibus, apice recurvatis, undique tuberculis minutis rugosis; pedunculo simplici vel ramoso, floribus laxe spicatis, bracteis pedicello florum paulo brevioribus. *Nob. Cat. rais. p. 9. — Haw. Suppl. p. 62. (sub Apicra.)*

ALOE subrigida *Schult. Syst. 7. p. 654.*

APICRA rigida; caulescens, foliis multifariis imbricato-patulis subreflexis, ovatis apice triquetris, papilloso-scabris, supra concavis, margine crenulatis. *Willd. Mag. p. 272. Nr. 19. (excl. synon. DC.)*

ALOE rigida *Jacq. Fragm. bot. t. 108.*

RADIX cylindracea, cornosa, fibrosa.

CAULIS poll. 6-8 altus, erectus, basi et superne ramosus, foliis tectus.

FOLIA conferta, trifariam in linea dense spirali subimbricata, suberecto-patentia, recurvata, poll. 2 longa et lin. 4-6 medio lata, basi paulum angustiora superne attenuata, cuspidata, laeteviridia, ad solem rubescentia, crassiuscula, rigida, undique (basi interiore excepta) tuberculis creberrimis scabra, supra canaliculatum excavata, subtus convexa apicem versus compressa, acute et subinaequilateri-carinata; ad margines carinamque cartilaginea, tuberculato-crenulata, scabra.

PEDUNCULUS floralis plerumque simplex, tenuis, nudus, roseo-cinereus.

FLORES racemosi, suberecti, pedicellati. Bracteae parvulae, linea rubra notatae, pedicello dimidio breviores.

PERIANTHUM ad $\frac{2}{3}$ tubulosum, obclavatum, albidum, viride striatum, limbo bilabiato labiis binis revolutis; laciniae roseae, obtusae, linea media saturatiore notatae, exterioribus planioribus, interioribus (suprema latiuscula) canaliculatis, undulatis.


STAMINA perianthii tubo breviora, alternatim inaequalia. Filamenta subulata, albida. Antherae slavae.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceo-trigonum. Stylus filamentis brevior. Stigma obtusum.

CAPSULA matura breviuscula, cylindraceo-trigona.

Habitat in Prom. b. spei. Floret aestate.

Observ. Cl. Willdenow hanc plantam pro *Al. rigida* DC. habuit, et error, propter imperitam delineationem in tab. 62. pl. grass., ignoscendus est. Bona et distincta est species, cui primo nomen *Al. pseudo-rigidae* tribui, et quae ab *Al. torquata* foliis perspiralibus, trifarie divergentibus, subulato-attenuatis, et undique tuberculato-asperis, differt. Sobolibus ramisque frequentibus facile propagatur.





A. rigidula.

(§. 4. — Fig. 3.)

ALOE RIGIDA Dc.

(*HAWORTHIA Duval.*)

ALOE rigida; subcaulescens, foliis perspiraliter subquinquefariis ovato-lanceolatis patentি-recurvulis subattenuato-acutis perviridibus, supra concaviusculis, subtus convexis imo apice oblique carinulatis, utrinque rugosis ad margines carinamque crenulatis.

ALOE rigida; foliis inermibus caespitosis aut subspiralibus patulis rigidis lanceolato-acutis. DC. pl. grass. t. 62. — Ait. Kew. ed. 2. Vol. 2. p. 298. (excl. synon. Bot. Mag.) — Haw. Rev. p. 49. (sub *Haworthia*.) — Schult. Syst. 7. p. 655.

APICRA expansa; caulescens, foliis multifariis ovatis acuminatis imbricato-patulis tenuissime scabris, supra concavis, margine cartilagineis integerrimis. Willd. Mag. p. 272. No. 18.

ALOE expansa; β. paulo major. Haw. Trans. Lin. Soc. 7. p. 8. — Synop. p. 91. (sub *Haworthia*.)

ALOE cylindracea β. rigida. Lam. Enc. 1. p. 89.

RADIX cylindracea, carnosa, fibrosa.

CAULIS poll. 4-5 altus, basi prolifer, foliis tectus.

FOLIA conferta, subquinquefariam in linea dense spirali disposita, poll. 2 cum lin. 3-5 longa, et lin. 8-10 basi lata, juniora erecto-patentia, seniora patentissima, recurvula, attenuato-acuta, perviridia, crassa, rigidissima, supra plano-concaviuscula laeviora, subtus convexa rugosa, apice inaequilateri-triquetra, quandoque obsolete 2-3 crenulata, ad margines carinamque cartilagineo-subcrenulata.

PEDUNCULUS floralis bipedalis et ultra, ramosus, tenuis, nudus, cinereus.

FLORES subspicati, suberecti, pedicellati. Bracteae latiusculae, linea rubra notatae, pedicellum adaequantes.

PERIANTHIMUM ad $\frac{2}{3}$ tubulosum, obclavatum, albidum, pallide viridi striatum, limbo bilabiato labiis binis revolutis; laciniae albidae, obtusae, linea media fusco-viridula notatae, exterioribus planioribus, interioribus (suprema latiuscula) canaliculatis, undulatis.

STAMINA perianthii tubo breviora, alternatim inaequalia. Filamenta subulata, albida. Antherae flavae.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceo-trigonum. Stylus filamentis brevior. Stigma obtusum.

CAPSULA matura breviuscula, subtrigona.

Habitat in Prom. h. spei. Floret aestate.

Observ. Hanc plantam primo observavit cl. Lamarck, qui illam cum *Al. cylindracea* sua (*Al. imbricata Haw.*) conjunxit. Ex illo tempore, in horto parisiensi culta, a cl. de Candolle anno 1799 sub nomine *Al. rigidae* descripta fuit, et hocce nomen propter prioritatem servandum est. Sed tabula 62. *pl. grass.* omnino imperfecta est, et specimen *Al. rigidae* exhibet exsiccatum et sole deustum, in quo planta valida vix agnoscenda est. Ab *Al. subrigida* differt haec species caule humiliore, et foliis subquinquefariis latioribus, rigidioribus, laevioribus, magisque expansis. Sobolibus ad basin plantae frequentibus facile propagatur.



A. rigida expansa.

(§.4. — Fig. 3.β.)

(§. 4. Fig. 3. β.)

ALOE RIGIDA expansa Nob.

ALOE rigida β. expansa; foliis oblongo-lanceolatis laevioribus patenti-recurvulis.

ALOE expansa; subcaulescens, foliis multifariis viridibus immaculatis, junioribus patulis, senioribus horizontalibus rugosiusculis. *Haw. Trans. Lin. Soc. 7. p. 8.* — *Synop. p. 91.* (*sub Haworthia*) — *Bot. Cab. t. 1430.* — *Schult. Syst. 7. p. 656 et 1715.*

ALOE rigida *Nob. Cat. raison. Nr. 9.*

APICRA patula; subcaulescens, foliis multifariis oblongo-lanceolatis patentibus apice triquetris cuspidatis, utrinque glabris, tenuissime punctatis. *Willd. Mag. p. 272. Nr. 16.* (*excl. Synon. Al. pertusae. Haw.*)

RADIX et CAULIS; *ut in Al. rigida.*

FOLIA vix poll. 2 longa et lin. 7 lata, juniora ac seniora patentissime recurvula, laevissime rugosa, nitidula.

PEDUNCULUS, FLORES, PERIANTHUM, STAMINA, PISTILLUM, CAPSULA; *ut in specie.*

Observ. *Al. expansa*, quam cl. Haworth in *Trans. Lin. Soc. anno 1801* instituit, statura minore solum ab *Al. rigida* DC. differt, et varietas *major*, ei adscripta, omnino ad hanc speciem accedit. Cl. Willdenow, vero, qui *Al. subrigidam* pro De Candollii speciem habuit, has varietates separavit et *minorem* sub nomine *Al. patulae* descriptis. Dubitanter ad eam refert *Al. pertusam* *Haw.*; at haec ultima species, in Commelinii Praeludiorum tabula 25 solum immixa, prorsus delenda est, quia haec tubula (sicut jam t. 23) evidenter *Crassulae* aut *Turgosiae* speciem exhibet, quae foliis oppositis, decussatis ab Alois omnibus longe recedit. Sobolibus frequentibus facile propagatur haec varietas, quam iconem propria illustrare volui.



A. Granata minor.

(§. 6. — Fig. 6. β.)

(§. 6. Fig. 6. β.)

ALOE GRANATA minor Nob.

ALOE granata β. *minor*; foliis late lanceolato-acuminatis numerosioribus, tuberculis margaritaceis minutis creberrimis.

HAWORTHIA granata β. *polyphylla*; foliis duplo numerosioribus, margaritis crebribus. *Haw. Revis.* p. 203. — *Schult. Syst.* 7. p. 650. (*sub Aloe.*)

ALOE margaritifera DC. *pl. grass.* t. 57.

RADIX; *ut in specie.*

CAULIS nullus.

FOLIA numerosiora, minus carnosa, poll. 2 longa et lin. 9 basi lata, magis attenuato-acuminata, incurvula, tuberculisque margaritaceis instructa minoribus ac numerosioribus.

SCAPUS, FLORES, PERIANTHUM, STAMINA, PISTILLUM, CAPSULA; *ut in Al. granata.*

Observ. Haec varietas, quae rarius in hortis occurrit, notatu digna est, et eam iconem illustrare volui. *Margaritacearum* sectio difficilis et numerosa est, et specierum varietatumque notabilium discrimina clarius percipiuntur oculis subjecta, quam verbis explicata. Soboles intrafoliacei infrequentes.



A. attenuata clariperla.

(S. 6.—Fig. 12. β.)

(§. 6. Fig. 12. β.)

ALOE ATTENUATA clariperla Nob.

ALOE attenuata β. *clariperla*; foliis erecto - recurvulis, supra tuberculis margaritaceis conspicuoribus, subtus albidioribus, magis extantibus magisque in fascias confluentibus.

HAWORTHIA clariperla; foliis subulato - acutis, undique praeclari perlatis, perlis subtus majoribus. Haw. in Phil. Mag. et Ann. 1828. p. 186. — Schult. Syst. 7. p. 646. et 1712. (sub Aloe.)

RADIX et CAULIS; ut in *Al. attenuata*.

FOLIA poll. 2 cum dimiduo longa et lin. 7-9 basi lata, erectiora, minusque in cuspidem producta; supra tuberculis minutis, conspicuis, sparsis instructa, subtus tuberculis pulchrioribus, validioribus, albidiissimis, in fascias transversas magis confluentibus.

PEDUNCULUS, FLORES, PERIANTHUM, STAMINA, PISTILLUM, CAPSULA, ut in specie.

Observ. Hanc plantam, quae tuberculis clarioribus ac paulo validioribus solum ab *Al. attenuata* differt, pro hybrida prole eo magis habeo, quod alia varietas colitur in horto Dyckensi foliis angustioribus, sed tuberculis instructis jami magis conspicuis quam in *Al. attenuata*.



A. Reinwardtii.
(§. 6.— Fig. 16.)

ALOE REINWARDTI Nob.
(HAWORTHIA Duval.)

ALOE Reinwardti; caulescens, foliis erectis coarctato-incurvulis acutis rigidis, supra convexiusculis laevibus nitidis, subtus convexis nervoso-striatis, tuberculis margaritaceis distinctis minutissimis, longitudinaliter et transverse serialiter dispositis.

ALOE Reinwardti; subcaulescens, foliis multifariis erectis coarctatis acutis rigidis, supra laevibus nitidis, subtus striatis; tuberculis margaritaceis minutissimis distinctis longitudinaliter et transversim in lineas dispositis. *Nob. obs. bot. 1821. p. 37. — Schult. Syst. 7. p. 647.*

HAWORTHIA Reinwardti, foliis multifariis erecto-incurvis coarctatim imbricantibus laevibus, subtus margaritis minutis distinctis longitudinaliter transverseque fasciatim dispositis. *Haw. Rev. p. 53. (errore in Suppl. p. 57. pro Haworthia fasciata habita; excl. ergo diagnosis et synonymo.)*

RADIX cylindracea, carnosa, fibrosa.

CAULIS 4-6 poll. altus, erectus, foliis tectus, basi prolifer.

FOLIA multifaria, conferta, numerosissima, coarctato-imbricata, incurvula, rigida, poll. 2 longa et lin. 6 basi lata, subinde attenuata, cuspidata, laetissime viridia, sed sub diu aut soli exposita rubescens, supra convexiuscula laevissima nitida, subtus semicylindracea imo apice carinata, longitudinaliter nervoso-striata, striis 10-12 tuberculis consertis instructis (unde tubercula in lineas longitudinales), tubercula margaritacea minuta distincta, transverse etiam in lineas disposita.

PEDUNCULUS floralis pedalis, simplex, filiformis, fuscus, bracteis quibusdam sterilibus instructus.

FLORES subspicati, suberecti, breve pedicellati. Bractae latiusculae pedicello paulo longiores.

PERIANTHIUM ad 2/3 tubulosum, obclavatum, albido-roseum viridi striatum, limbo bilabiato, labio supero minus revoluto; laciniae subaequales, obtusulae, albidae, medio linea rubra natatae.

STAMINA perianthii tubo breviora, alternatim inaequalia. Filamenta subulata viridula. Antherae flavae.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceo-trigomum. Stylus filamentis brevior. Stigma obtusum.

CAPSULA matura elongata, tenuis, cylindraceo-trigona.

Habitat in Prom. b. spei. Floret mense Aug.—Sept.

Observ. A cl. Reinwardt anno 1818 advecta ad *Al. fasciata* accedit; sed differt caule elato, foliis coarctato-erectis, tuberculisque minoribus nunquam confluentibus. Sobolibus ad basin plantae frequentibus facile propagatur.



A. coarctata.

(§. 6.—Fig. 17.)

ALOE COARCTATA Haw.

(*HAWORTHIA Duval.*)

ALOE coarctata; caulescens, foliis erectis coarctato-incurvulis attenuatis acutis rigidis, supra convexiusculis laevibus, subtus convexis apice carinatis, tuberculis margaritaceis distinctis minutissimis remotis sparsis.

HAWORTHIA coarctata; erecta; foliis incurvato-imbricantibus sordide viridibus; intus glabris, externe maculis parvis sparsis albicantibus. *Haw. in Phil. Mag. et Journ. 1824. p. 301. — Schult. Syst. 7. p. 647. (sub Aloe.)*

RADIX cylindracea, carnosa, fibrosa.

CAULIS 7 - 8 poll. altus, erectus, foliis tectus, basi et quandoque superne prolifer.

FOLIA multifaria, conferta, numerosa, coarctato-imbricata, incurvula, rigida, poll. 2 cum lin. 6 - 9 longa, et lin. 9 - 10 basi lata, sensim attenuata, cuspidata, luride viridia; supra plano-convexa, laevia nec nitida; subtus basi convexa laevia, apicem versus carinata et longitudinaliter obsolete nervoso-striata, striis 4 - 6 tuberculis remotis instructis; tubercula pauca, minutissima, vix margaritacea, transverse irregulariter sparsa.

PEDUNCULUS floralis simplex, filiformis, fuscus, nudus aut bracteis quibusdam sterilibus instructus.

FLORES subspicati, suberecti, pedicellati. Bracteae parvulae, coloratae, pedicellum adaequantes.

PERIANTHUM ad $\frac{2}{3}$ tubulosum, obclavatum, albidum viridi striatum, limbo bilabiato, labio supero minus revoluto; laciniae subaequales, obtusiusculae, albidae basi viridulae, medio linea rubra notatae.


STAMINA perianthii tubo breviora, alternatim inaequalia. Filamenta subulata, viridula. Antherae flavae.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceo-trigonum. Stylus filamentis brevior. Stigma obtusum.

CAPSULAM maturam non vidi.

Habitat in Prom. b. spei. Floret aestate.

Observ. Haec species a Dom. Bowie anno circiter 1823 in Angliam advecta, proxime accedit ad *Al. Reinwardti*; sed differt caule elatiore, foliis majoribus supra opacis, subtus obsoletissime nervosis, et tuberculis rarioribus, minus conspicuis, in lineas longitudinales, sed non transversas ordinatis; unde tubercula sparsa apparent. Sobolibus frequentibus facile propagatur.



A. Scabora.

(§. 7.—Fig. 1.)

(§. 7. Fig. 1.)

ALOE SCABRA Haw.

(*HAWORTHIA* Duval.)

ALOE scabra; acaulis, foliis spiraliter trifariis erecto-patulis rigidissimis, supra planis, subtus convexis apice incrassatis incurvulis oblique carinatis, utrinque concoloribus tuberculato-asperrimis.

HAWORTHIA scabra; rigida; foliis semicylindraceis, induratissimis, superne acutis seu incrassatis, triquetris, extus tuberculato-scaberrimis, intus scabris, basi versus laevibus. *Haw. Suppl. p. 58. Rev. p. 51. — Schult. Syst. 7. p. 644. (sub Aloe.)*

RADIX cylindracea, carnosa, fibrosa.

CAULIS nullus.

FOLIA omnia radicalia, parum numerosa, spiraliter trifaria, poll. 2 et ultra longa et lin. 9 basi lata, juniora erecta, seniora expansa, supra plana aut subconcava, subtus convexa, inaequilateri-carinata carina superne dilatata, apice incurvula obtusiuscula cum mucrone, indurata, rigida, livide viridia, utrinque tuberculata tuberculis cartilagineis concoloribus, creberrimis, subserialibus, subconfluentibus, scaberrimis.

PEDUNCULUS floralis vel scapus pedalis, simplex, filiformis, nudus.

FLORES racemosi, suberecti, pedicellati. Bracteae parvulae pedicello breviores.

PERIANTHIIUM ad $\frac{2}{3}$ tubulosum, obclavatum, spurco-albidum rubro striatum, limbo bilabiato labio supero minus revoluto; laciniae albidae, obtusiusculae, linea media rubra notatae, exterioribus planioribus et brevioribus, interioribus (summa latiuscula, viridi) canaliculatis.

STAMINA perianthii tubo breviora, alternatim inaequalia. Filamenta subulata, flavicantia. Antherae parvae, luteae.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceo-trigonum. Stylus filamentis brevior. Stigma obtusum.

CAPSULAM maturam non vidi.

Habitat in Prom. b. spei. Floret mense Aug.—Sept.

Observ. Haec distinctissima species, nullae aliae vere affinis, jam vigebat in Horto Kewensi anno 1828. Propter folia parum numerosa, spiraliter trifaria, scabra, et scapo filiformi nudo, sectioni *Al. Luridarum* adscribenda est. Soboles rarissime profert.

Icon plantam adhuc novellam exhibit. Folia adultiora sere duplo longiora evadunt.



A. recurva.

(S. 7. — Fig. 5.)

(§. 7. Fig. 3.)

A L O E R E C U R V A *Haw.*

(*HAWORTHIA Duval.*)

ALOE recurva; subacaulis, foliis spiraliter subtrifariis luride olivaceis recurvo-patentibus subulato-attenuatis, supra planiusculis obsolete lineatis glabriusculis, subtus tuberculato-asperis imo apice oblique carinatis, ad margines prominulos denticulatis.

HAWORTHIA recurva; foliis recurvis semiteretibus ovato-longe attenuatis subulatis; supra laevibus, margine tuberculatum subelevato-serrulato; subtus scabris e tubercululis parvis crebris viridibus. *Haw. Revis.* p. 51.

HAWORTHIA recurva; foliis subulatis crassis erecto-recurvis; supra concavis, subtus subtuberculatis; marginibus obscure margaritaceo-tuberculatis. *Haw. Synop.* p. 94.

ALOE recurva; foliis subulatis recurvatis: supra concavis, subtus subtuberculatis; marginibus margaritaceo-tuberculatis. *Haw. Trans. Lin. Soc.* 7. p. 10. — *Ait. Kew. ed. 2. vol. 2.* p. 300. — *Willd. Mag.* 5. p. 270. (*sub Apicra*) — *Bot. Mag.* t. 1353. — *Nob. Cat. rais.* p. 4. — *Schult. Syst.* 7. p. 644.

RADIX cylindracea, carnosula, fibrosa.

CAULIS nullus, aut aetate brevis.

FOLIA subtrifuriam in linea spirali disposita, poll. 1 cum lin. 6-9 longa, et poll. 1 basi lata, sensim attenuata, subulata, acuta; juniora erecto-recurva, olivaceo-viridia, seniora patenti-recurva lurida, carnosa, rigida; supra glabriuscula, seniora convexo-, juniora concavo-planiuscula, lineis longitudinalibus 3-5 saturationibus (media quandoque prominula) obscure notata; subtus convexa apice inaequilateri-carinata, crebre tuberculata; ad margines elevatos, sicut et ad carinam, tuberculis seu denticulis cartilagineis subconcoloribus parvulis, instructa.

PEDUNCULUS floralis simplex, filiformis, nudus.

FLORES laxe racemosi, suberecti, pedicellati. Bracteae pallidae, acutiusculae, pedicello breviore.

PERIANTHUM ad $\frac{2}{3}$ tubulosum obclavatum, albidum rubro et viridi striatum, limbo bilabiato, labio supero minus revoluto; laciniae albae obtusae, exterioribus brevioribus linea rubra, interioribus (suprema latiuscula) ad margines undulata et linea media, basi viridi apice rubra, notatis.

STAMINA perianthii tubo breviora, alternatim inaequalia. Filamenta subulata viridula. Antherae flavidae.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceo-trigonum. Stylus filamentis brevior. Stigma inconspicuum.

CAPSULA matura elongata, cylindraceo-trigona, obtusa.

Habitat in Prom. b. spei. Floret aestate.

Observ. Haec species advecta fuit a cl. Masson in Angliam anno 1795. Valde differt ab *Al. scabra* et ab *Al. sordida*, et magis accedit ad antiquam *Al. venosam Lam.* (*Al. tricolorem Haw. Trans. Lin. Soc. p. 25. et Willd. Mag. p. 271.*) quae hodie in hortis nostratis amissa, et solum ex tab. 29 et descriptione in Commelini Praeludiis nobis cognita est. At haec planta certissime, tempore Commelini, in horto Amstelodamensi culta fuit et ibi floruit; quare crederem *Al. recurvam* nostram esse seminalem varietatem hujusce plantae. Flores nullum praebent discriminem, et folia quamvis minora, subtus tuberculata, et supra lineis minus conspicuis notata, satis adhuc referunt primitivam formam. *Al. recurvam* eo magis pro hybrida prole habeo, quod a semine semper variat. Sobolibus, ad basin plantarum senectarum frequentibus, facile propagatur.



A. tessellata.

(§. 8. — Fig. 1.)

A L O E T E S S E L L A T A Haw.

(*HAWORTHIA* Duval.)

ALOE tessellata; subacaulis, foliis spiraliter subtrifariis olivaceis recurvo-patentibus oblongis acutis, supra plano-convexusculis subdepressis tessellatim reticulatis laevibus, subtus convexis asperiusculis apice carinatis, ad margines remote dentatis.

HAWORTHIA tessellata; foliis retuso-subdeltoideis pallide viridibus, superne nigro-viridi-tessellatis, extus nigro-viridibus, asperis. *Haw. in Phil. Mag. et Journ. 1824. p. 300.*
— *Schult. Syst. 7. p. 635. (sub Aloe.)*

RADIX cylindracea, carnosa, sobolifera.

CAULIS nullus, aut e superpositione foliorum, brevis.

FOLIA subtrifariam in linea spirali disposita, poll. 2 longa et vix poll. 1 basi lata, sensim attenuata, acuta, juniora erecto-recurva olivaceo-viridia, seniora patent-recurva luride viridia saepe rubescens, carnosa, subrigida; supra laevia basin versus plana concolora, superne incrassata, convexiuscula, subdepressa, et lineis longitudinalibus 5 albidis transverse reticulatis, tessellatim picta; subtus convexa apice carinata, subtuberculata; ad margines dentibus seu aculeis cartilagineis parvulis, albidis, respicientibus, remote instructa.

PEDUNCULUS floralis simplex, filiformis, subnudus, rubescens.

FLORES subspicati, suberecti, pedicellati. Bracteae coloratae latiusculae, pedicellum adaequantes.

PERIANTHIIUM ad $\frac{2}{3}$ tubulosum, obclavatum, albidum rubro et viridi-striatum, limbo bilabiato, labio supero minus revoluto; laciniae albidae obtusae, exterioribus planioribus linea media fuscescente, interioribus canaliculatis linea viridi notatis.

STAMINA perianthii tubo breviora alternatim inaequalia. Filamenta subulata viridula. Antherae flavidae.


PISTILLUM. Ovarium cylindraceo-trigonum. Stylus filamentis brevior. Stigma obtusum.

CAPSULAM maturam non vidi.

Habitat in Prom. b. spei. Floret aestate.

Observ. Anno circiter 1823 advecta fuit haec species in Angliam. Ab *Al. recurva* differt foliis latioribus, mollioribus, crassioribus, superne incrassatis, deltoideo-retusulis nec subulato-attenuatis, ex albido et viridi tessellatim pictis nec concoloribus. Sobolibus, nec ad basin plantae, sed e radicibus ortis, facile propagatur.

Adest in horto Dyckensi varietas foliis subtus magis tuberculatis et ergo asperioribus.



A. parvula.

(§. 8. — Fig. 2.)

(§. 8. Fig. 2.)

A L O E P A R V A Haw.

(*HAWORTHIA* Duval.)

A L O E p a r v a; subacaulis, foliis spiraliter subtrifariis sordide perviridibus erecto - recurvis orbiculato - acutis, supra subdepressis planiusculis tessellatim reticulatis laevibus, subtus convexis asperis imo apice carinatis, ad margines remote dentatis.

HAWORTHIA parva; foliis cordato - acutis, subretusis, recurvulis, ciliis minutissimis respicientibus albis, apice subtessellatis. *Haw. in Phil. Mag. et Journ. 1824. p. 301. — Schult. Syst. 7. p. 653. (sub Aloe.)*

RADIX cylindracea, carnosa, sobolifera.

CAULIS nullus, aut e superpositione foliorum, brevis.

FOLIA orbiculato subtrifariam in linea spirali disposita, poll. 1 cum lin. 3-6 longa, et poll. 1 cum lin. 3-5 lata, apice acuta, erecto - recurvula, sordide perviridia, carnosa, subrigida; supra laevia basin versus concava, concolora, superne incrassata, depresso - planiuscula et lineis longitudinalibus 7 albidis transverse reticulatis tessellatim picta; subtus convexa imo apice carinata, aspere subtuberculata; ad margines dentibus seu aculeis cartilagineis parvulis, albidis, respicientibus, remote instructa.

PEDUNCULUS floralis simplex, filiformis, subnudus, cinereo - rubescens.

FLORES racemosi, suberecti, pedicellati. *Bractae coloratae, latiusculae, pedicello dimidio breviores.*

PERIANTHIIUM ad $\frac{2}{3}$ tubulosum, obclavatum, albidum rubro et viridi striatum, limbo bilabiato, labio supero suberecto, infero revoluto; laciniae albidae, obtusae, exterioribus (*infima revoluta*) planioribus linea media fuscescente, interioribus (*suprema latiuscula*) canaliculatis, linea viridi notatis.

STAMINA perianthii tubo breviora, alternatim inaequalia. *Filamenta subulata albida. Antherae flavidae.*

PISTILLUM. *Ovarium cylindraceo - trigonum. Stylus filamenta breviora adaequans. Stigma obtusum.*

CAPSULA matura parvula, utrinque attenuata.

Habitat in Prom. b. spei. Floret aestate.

Observ. Anno circiter 1823 advecta fuit in Angliam haec species quae ab *Al. tessellata* differt foliis latioribus, brevioribus magisque retusis, perviridibus, et supra lineis 7 (nec 5) densius reticulatis. Propagatur sobolibus radicalibus.



A. mirabilis.

(§. 9.—Fig. 1.)

(§. 9. Fig. 1.)

ALOE MIRABILIS Haw.

(*HAWORTHIA* Duval.)

ALOE mirabilis; acaulis, foliis quinquefariis erectis apice horizontaliter truncatis recurvulis cuspidatis, supra laeteviridibus parte retusa lineatis laevis, subtus purpurascens tuberculatis basi convexis superne carinatis, ad margines carinamque ciliato-aculeatis.

ALOE mirabilis; foliis quinquefariis, retuso-deltoides, cuspidatis, marginibus carinaque ciliato-spinosis, supra glabriusculis, subtus tuberculatis, obsolete reticulatis. *Haw. Trans. Lin. Soc. 7. p. 9.* — *Synop. p. 95. (sub Haworthia)* — *Ait. Kew. ed. 2. vol. 2. p. 300.* — *Nob. Cat. rais. p. 3.* — *Schult. Syst. 7. p. 645.*

APICRA mirabilis; acaulis, foliis quinquefariis triquetris apice horizontaliter depresso-truncatis, margine carinaque ciliato-spinosis supra glabris, subtus subtuberculatis obsolete reticulatis. *Willd. Mag. 5. p. 269. No. 4.*

RADIX cylindracea, carnosa, fibrosa.

CAULIS nullus.

FOLIA radicalia, subrosulato-quinquefaria, poll. 1 cum lin. 3-5 longa et lin. 9 basi lata, erecta, subrigida, recurvula, cuspidata in setam excurrentia; supra laeteviridia glabriuscula, basi concava, superne incrassata, horizontaliter depresso-truncata, plano-convexiuscula, subpellucida et lineis 3-5 pallidioribus notata; subtus convexa apice carinata, tuberculata, tuberculis ad lucem pellcentibus, aestate purpurascens, hyeme viridia; ad margines et ad carinam ciliis cartilagineis parvulis, rigidiusculis, dense instructa.

PEDUNCULUS floralis seu scapus simplex, tenuis, viridis, bracteis sterilibus instructus semi-amplexicaulibus, cuspidatis, subscariosis, stramineis.

FLORES subspicati, erecti, pedicellati. Bracteae latiusculae coloratae, pedicellum adaequantes.

PERIANTHUM ad $\frac{1}{2}$ tubulosum, obclavatum, roseo-albidum viridi striatum, limbo bilabiato, labio supero minus revoluto; laciniae roseo-albidae obtusae, subaequales, basi viridiussulae linea media rubra notatae.


STAMINA perianthii tubo breviora, alterne inaequalia. Filamenta subulata, viridia. Antherae flavidae.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceo-trigonum. Stylus filamentis brevior. Stigma obtusum, obsolete trilobatum.

CAPSULAM maturam non vidi.

Habitat in Prom. b. spei. Floret aestate.

Observ. A cl. Masson anno 1795 in Angliam advecta fuit. Ciliis marginalibus et foliis subtus tuberculatis accedit haec species ad *Al. parvam*; sed differt characteribus sectione *Al. Retusarum* adscriptis. Propagatur sobolibus ad basin plantarum adultarum frequentibus.



A. asperula.

(S. 9. — FIG. 2.)

(§. 9. Fig. 2.)

ALOE ASPERULA Haw.
(HAWORTHIA Duval.)

ALOE asperula; acaulis, foliis quinquesariis erectis apice horizontaliter truncatis recurvulis pallide viridibus, supra parte retusa convexiusculis lineatis tuberculato-asperis, subtus laevibus basi convexis superne carinatis, ad margines carinamque minutissime ciliatis.

HAWORTHIA asperula; foliis retuso-deltoides, denticulatis, parte retusa asperis pluriisque lineolatis. *Haw. in Phil. Mag. et Journ. 1824. p. 300. — Schult. Syst. 7. p. 635 (sub Aloe.)*

RADIX cylindracea, carnosa, fibrosa.

CAULIS nullus.

FOLIA radicalia subrosulato-quinquesaria, poll. 1 cum lin. 3-5 longa, et lin. 8-9 basi lata, erecto-recurvula, subrigida, utrinque pallide viridia; supra basi concava laevia, superne incrassata horizontaliter depresso-truncata, turgidulo-convexa, pellucida, papillis minutis concoloribus aspera, lineisque 7-9 pallidioribus notata; subtus laevia, triquetro-convexiuscula, apice carinata; ad margines et ad carinam ciliis aut dentibus minutissimis instructa.

PEDUNCULUS floralis seu scapus basi crassiusculus, compressus, simplex, viridis, bracteis sterilibus instructus amplexicaulibus, cuspidatis, subscariosis, insimis dorso serrulatis confertis, superioribus remotiusculis.

FLORES spicati, erecti, sessiles. Bracteae coloratae latae perianthii tubo dimidio breviores

PERIANTHIUM ad $\frac{1}{2}$ tubulosum, obclavatum, roseo-albidum, parte antica viridi et postica roseo-striatum, limbo bilabiato, labio supero minus revoluto; laciniae roseo-albidae, obtusae, subaequales, linea media rubra notatae.

STAMINA perianthii tubo brevioru, alternatim inaequalia. Filamenta subulata, flava. Antherae flavae.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceo-trigonum. Stylus filamentis brevior. Stigma obtusum.

CAPSULA matura cylindraceo-trigona, elongata, superne paulum attenuata, obtusa.

Habitat in Prom. b. spei. Floret aestate.

Observ. Anno circiter 1823 advecta suit haec species in Angliam. Ab *Al. mirabili*, cui proxima, differt foliis utrinque concoloribus, minus numerosis, in parte retusa papillosum, et subtus laevibus.





A. altilinea.

(§. 11. — Fig. 3.)

(§. 11. Fig. 3.)

ALOE ALTILINEA Haw.

(*HAWORTHIA* Duval.)

ALOE altilinea: foliis rosulato-multifariis molibus laevibus patenti-incurvulis pallide viridibus oblongis, superne dilatatis pelluentibus apice acutis in setam exeuntibus, supra convexiusculis linea costali prominula, subtus convexo-carinulatis, ad margines inferne carinamque superne minute denticulatis.

HAWORTHIA altilinea; foliis incurvulis ovato-lanceolatis, aristatis, minute denticulatis; superne utrinque linea elevata. *Haw. in Phil. Mag. et Journ. 1824. p. 301. — Schult. Syst. 7. p. 638.*
(*sub Aloe.*)

RADIX cylindracea, carnosa, fibrosa.

CAULIS nullus.

FOLIA multifaria conferta in rosulam disposita, poll. 2 cum dimidio (absque seta) longa, et lin. 9 superne lata, basin versus attenuata, apice subulato-acuta in aristum membranaceam semipollicarem exeuntia, juniora erecta seniora patentia, incurvula, herbacea, mollia, pallide viridia, laevissima, utrinque convexa apicem versus crassiora, aquoso-pellucida lineisque subreticulatis viridibus opacis striata; supra linea media elevata seu costa, notata; subtus carinulata; ad margines superne omnino laevia, inferne vero et ad carinae apicem denticulato-ciliata, ciliis minutis pellucidis.

PEDUNCULUS floralis seu scapus simplex, crassiusculus, viridis, bracteis sterilibus instructus.

FLORES subspicati, suberecti, breve pedicellati. Bracteae latiusculae, coloratae, pedicello paulo longiores.

PERIANTHIIUM ad $\frac{1}{2}$ tubulosum breve, obclavatum, albidum viridi striatum, limbo bilabiato labio supero minus revoluto; laciniae latiusculae, subaequales, albidae linea sordide viridi notatae, obtusae, medio in labio supero erecta.

STAMINA perianthii tubo breviora, alterne inaequalia. Filamenta viridula. Antherae flavae.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceo-trigonum. Stylus filamentis brevior. Stigma obtusum.

CAPSULAM maturam non vidi.

Habitat in Prom. b. spei. Floret aestate.

Observ. Haec species in horto Eq. Parmentier, anno circiter 1820, e seminibus capensibus enata est. Valde accedit ad *Al. cymbaefoliam* et *planifoliam* Haw; sed satis differt foliis oblongis, cuspidato-acutis, supra convexiusculis lineaque media instructis. Sobolibus intrafoliaceis satis frequentibus, facile propagatur.



A. setosa.

(§.12.—Fig. 3.)

(§. 12. Fig. 3.)

ALOE SETOSA Schult.

(*HAWORTHIA Duval.*)

ALOE setosa; acaulis, foliis rosulato - multisariis rigidiusculis saturate viridibus opacis erecto - patentibus lanceolatis cuspidatis in aristam membranaceam excurrentibus, supra planiusculis laevibus, subtus convexiusculis carinatis, ad margines carinamque saepe duplice setosis, scitis crassiusculis cartilagineis albis.

HAWORTHIA setata; foliis lorato - sublanceolatis longe acuminatis setaque finientibus; superne subcarinatis, marginē carinaque ciliatim membranaceo - setatis. *Haw. Suppl.* p. 52. — *Schult. Syst.* 7. p. 641. (sub *Aloe.*)

HAWORTHIA setata; foliis lorato-lanceolatis acuminatis, setaque longa finientibus, marginibus carinaque ciliatim membranaceo - setatis. *Haw. Revis.* p. 56.

RADIX cylindracea, carnosa, fibrosa.

CAULIS nullus.

FOLIA radicalia multifaria confertissima, in rosulam disposita, lin. 15 (absque aristā) longa, et lin. 6 basi lata, attenuato - cuspidata, in aristam semipollicarem subdentatam excurrentia, juniora erecto - patula seniora patentia, recta, plus minusve saturate viridia, opaca nec apice pellucida; supra plano - convexiuscula laevia; subtus basi convexa, a medio ad apicem carinata aut bicarinulata; ad margines basin versus laevia, superne et ad carinulas setis cartilagineis validis, numerosis, subulatis, rectis, niveis instructa.

PEDUNCULUS floralis aut scapus simplex, crassiusculus, viridis, bracteis sterilibus instructus.

FLORES dense spicati, erecti, sessiles. Bractae latiusculae, pallidae, perianthii tubum busi involventes.

PERIANTHIUM ad $\frac{2}{3}$ tubulosum, obclavatum pallidissime roseum viride striatum, limbo bilabiato, labio supero minus revoluto; laciniae subaequales pallide roseae linea saturatiore notatae, obtusae, media in labio supero erecta.

STAMINA perianthii tubo breviora, subaequalia. Filamenta subulata albida. Antherae luteae.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceo-trigonum. Stylus filamentis brevior. Stigma obtusum.

CAPSULA maturam non vidi.

Habitat in Prom. b. spei. Florit aestate.

Observ. Haec species circa annum 1818 advecta fuit in Angliam. Cl. Haworth (*in Revis.* p. 56) illae adscribit tres varietates; nempe *β. nigricans*, quae a specie colore saturatiore solum recedit, et forte planta est, ex horto Kewensi accepta, quam tabula hic exhibet. Variedades *γ. media* et *δ. major* foliis pallide viridibus, setisque longioribus ac paucioribus, magis discedunt; sed in omnibus varietatibus folia sunt opaca, et hocce charactere haec species a caeteris hujus sectionis valde distincta remanet. In hortis rarissima est quia nunquam sere soboles profert.



A. chloracantha.

(§.15.—Fig.1.)

(§. 13. Fig. 1.)

ALOE CHLORACANTHA Haw.

(*HAWORTHIA* Durul.)

ALOE chloracantha; acaulis, foliis multifariis rigidiusculis atroviridibus erecto-recurvulis laevibus cupidato-attenuatis, supra planiusculis, subtus acute carinatis, ad margines carinamque dense serrulato-aculeatis.

HAWORTHIA chloracantha; foliis erecto-recurvulis, lorato-subulatis, acuminatis, atroviridibus, margine carinaque denticulatis; denticulis parvis viridibus, numerosis, quandoque geminis. *Haw. Reris* p. 57. — *Schult. Syst.* 7. p. 641. (*sub Aloe*.)

RADIX cylindracea, carnosa, fibrosa.

CAULIS nullus.

FOLIA radicalia, multifaria, sesquipollicem longa et lin. 7-8 basi lata, sensim attenuata, in cupidem triquetram producta et in setam exeuntia, atroviridia quandoque purpurascentia, subrigida, luevia, supra plano-concava, subtus basi convexa aut triquetro-compressa, superne triquetra et lateribus excavatis acute carinata; ad margines et ad curiam serrulato-aculeata, aculeis seu denticulis numerosis parvulis atro vel purpurascenti-viridibus.

PEDUNCULUS floralis seu scapus simplex, filiformis, viridis, bracteis sterilibus instructus semi-amplexicaulibus, aristatis.

FLORES spicati, erecti, fere sessiles. Bracteae coloratae, latiusculae, perianthii tubum basi involventes.

PERIANTHIIUM ad $\frac{1}{2}$ tubulosum, obclavatum, pallide roseum, viride striatum, limbo bilabiato, labio supero suberecto; laciniae roseo-albidae basi viridulue, acutiusculae, linea media rosea notatae.

STAMINA perianthii tubo breviora, alternatim inaequalia. Filamenta subulata flava. Antherae flavae.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceo-trigonum. Stylus filamentis multo brevior. Stigma obtusum obsolete trilobatum.

CAPSULAM maturam non vidi.

Habitat in Prom. b. spei. Floret aestate.

Observ. Haec species quae anno circiter 1820 in Angliam advecta fuit, a cl. Haworth pone *Al. atrovirentem* locata est. Sed ab illa, et a tota *Al. Reticulatarum* sectione, longe recedit, foliis omnino opacis, nullo modo reticulatim-pellucidis. Sectionem propriam, cum *Al. stenophyllum* consituere debet. Sobiles rarissime enascuntur ad basin plantae.



A. stenophylla.

(§.15.—Fig. 2.)

(§. 13. Fig. 2.)

A L O E S T E N O P H Y L L A Schult.

(*HAWORTHIA Duval.*)

ALOE stenophylla; acaulis, foliis multifariis mollibus laete-viridibus arcuato-patentibus rugulosis linearis-attenuatis subulatis, supra planis, subtus inaequilateri-carinulatis, ad margines carinamque minutissime ciliatis.

HAWORTHIA angustifolia; foliis lorato-attenuatis, arcuatim patenti-recurvis, perviridibus, apice subcarinatis; carina orisque creberrime denticulatum exasperatis.
Haw. in Phil. Mag. et Journ. 1825. p. 283. — Schult. Syst. 7. p. 641. (sub Al. stenophylla.)

RADIX cylindracea, carnosa, fibrosa.

CAULIS nullus.

FOLIA radicalia, multifaria, poll. 2-3 longa et lin. 4 basi lata, attenuata, linearis-elongata, subulata, in setam excurrentia, laete viridia aut sole ardente rubescens, subherbacea, obsolete striata, rugosa; supra plana linea media saepe prominula; subtus convexiuscula, a medio ad apicem inaequilateri-triquetra, aut bi vel tricarinulata; ad margines et ad carinalias setulosa aut pilis crebris, minutissimis, exasperata.

PEDUNCULUS floralis seu scapus, simplex, filiformis, basi viridis, bracteis sterilibus instructus semiamplexicaulibus, acuminatis, aristatis.

FLORES laxe spicati, erecti, breve pedicellati. Bracteae pallidæ, pedicello longiores.

PERIANTHIIUM ad $\frac{1}{2}$ tubulosum, obclavatum, spurco-albidum, vix striatum, limbo vix bilabiato, labio supero suberecto, infero subrevoluto; laciniae albidae, acutiusculae, linea media basi viridi et apice rosea notatae.


STAMINA perianthii tubo breviora, alterne inaequalia. Filamenta subulata, albida. Antheræe luteæ.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceo-trigonum. Stylus filamentis multo brevior. Stigma obtusum.

CAPSULAM maturam non vidi.

Habitat in Prom. b. spei. Floret aestate.

Observ. A D. Bowie advecta fuit anno 1824 haec singularis species, quae foliis linearibus cum Haworthiis omnibus discrepat. Proxime attamen accedit ad *Al. chloracantham*; at differt foliis a basi angustioribus, mollibus, rugulosis, minutissime ciliatis nec serrulato-aculeatis.



A. Bowiea.

(§.14.—Fig. 1.)

(§. 14. Fig. 1.)

ALOE BOWIEA Schult.

(*BOWIEA Haw.*)

ALOE Bowiea; acaulis, foliis multifariis flexilibus glaucescenti-viridibus erecto-recurvis, basi latiusculis mox lorato-linearibus acuminatis, supra planiusculis laevibus, subtus convexis tuberculato-punctatis, ad margines remote aculeatis.

ALOE Bowiea; foliis lorato-linearibus, involuto-canaliculatis, acuminatis, apice recurvulis, glaucescenti-viridibus, sublaevibus: denticulis marginalibus cartilagineo-albis, numerosis; floribus laxe spicatis, patulis. *Schult. Syst. 7. p. 704.*

BOWIEA africana; foliorum marginalibus denticulis numerosis, floribus spicatis. *Haw. in Phil. Mag. or Ann. 123. — DC. Pl. rar. H. Gener. Diss. 6. t. 2.*

RADIX cylindracea, carnosa, fibrosa.

CAULIS nullus.

FOLIA radicalia, multifaria, numerosa, poll. 5 longa et lin. 7 basi lata, subinde attenuata, lorato-linearia rix lineam lata, acutiuscula cum mucronulo brevi, primo erecta conferta, dein recurvato-patentia, apice varie in vel reflexa, glaucescenti-perviridia, flexilia, gracilia; supra planiuscula aut marginibus inflexis subcanaliculata, impunctata, subtus basi convexa apice carinulata, inferne albido-punctata, punctis subprominulis regione costali scabridis; ad margines aculeis cartilagineis rigidiusculis, minutis, albidis, remote instructa.

PEDUNCULUS floralis seu scapus gracilis, simplex, teres, subpedalis, bracteis sterilibus, lanceolato-acutis instructus.

FLORES laxe in spicam saepe unilateralem dispositi, subpatuli, breve pedicellati. Bracteae pedicellum adaequantes.

PERIANTHUM tubulosum, subclavatum, sordide luteo-viride cum tinctura rufescente, limbo obsolete bilabiato, lacinias apice subrecurvulis.


STAMINA perianthii tubo longiora, alternatim inaequalia, assurgenter recurvula. Filamenta subulata alba. Antherae parvulae, flavae.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceo-trigonum. Stylus exsertus filimenta adaequans. Stigma obtusum, inconspicuum, sub lente villosulum.

CAPSULAM maturam non vidi.

Habitat in Prom. b. spei. Floret aestate.

Observ. A D. Bowie advecta fuit in Angliam, ante annum 1823, haec planta quam cl. Haworth, peregrinatoris ad memoriam, sub nomine *Bowieae africanae* descriptis; at characterem primo, in Phil. Mag. et Journ. 1824 huic generi tributum, ipse anno 1827 mutavit. Cl. Schultes hanc plantam generi *Aloes* adscribit, et illius exemplum secutus sum; tamen nec in *Apcirarum* aut *Haworthiarum* tribum, nec in *Aloarum* recte locanda est, et Sectionem aut tribum propriam cum *Al. myriacantha* *Haw.*, intermedium inter *Haworthias* ac *Aloas* veras, constituere debet. Sobolibus ad basin plantarum senectarum frequentibus, facile propagatur.



M. obconellum.

(§. 1. — Fig. 3.)

(§. I. Fig. 3.)

MESEMBRYANTHEMUM OBCONELLUM Haw.

MESEMBRYANTHEMUM obconellum; acaule obconicum glaucescenti-virens, punctis prominulis purpurascentibus in lineas ramosas subconfluentibus, corolla alba, ovario inclusu.

M. obconellum; virens, maculis confluentibus subtuberculiformibus, corolla alba, germe inclusu. Haw. in *Miscel. nat.* p. 21. — *Synop.* p. 203. — *Rev.* p. 83. — *Ait. Kew. ed. 2. vol. 3.* p. 213. — DC. *Prod.* 3. p. 417.

RADIX tenuissime fibrosa.

CAULIS nullus.

FOLIA vaginata, usque ad vaginas truncata et in corpusculum carnosum, obconicum, lin. 11-12 longum et lin. 7-8 superne latum, connata; vaginae basin versus laevissimae, pallide-virides, saepe purpurascentes; supra convexiusculae, obcordato-emarginatae cum fissura centrali brevissima, glauco-virides, atropurpureo-punctatae, punctis tuberculiformibus validis asperiusculis, in lineas ramosas confluentibus; corpuscula duo nova (uno saepe abortivo) involventes, et eorum egressione ruptae.

FLORES solitarii, e basi corpusculi (inter rudimenta duorum corpusculorum novorum) orientes, et superne e fissura centrali egressi, parvuli, vespere seu potius nocte expansi, pedunculati. **Pedunculus** corpusculo brevior, inclusus, inferne bracteis duobus instructus connatis, minutissimis, obtusis, apice bi vel tridenticulatis.

CALIX subglobosus quinquefidus, lobis aequalibus, erectis, obtusiusculis, rubescens, e corpusculo parum exsertis.

PETALA uniserialia, in tubum brevem basi coalita, angusta, integerrima, patentorecurva, alba.

STAMINA numerosa, erecta, longitudine corollae tubi. **Filamenta** alba, tenuissima. **Antherae flavae.**

PISTILLUM. Ovarium globosum. **Styli** 5 subulati, erecto-recurvuli, flavi.

CAPSULA quinquelocularis. Maturam non vidi.

Habitat in Prom. b. spei. Floret a mense Octobri ad Januarium.

Observ. Haec species, a cl. Masson in Angliam advecta, ab Anno 1794 in horto Kewensi culta est. Differt a **M. minimo** statura majore, punctis tuberculiformibus, ovario inclusu, petalisque albis.



M. multipunctatum.

(§. 3.—Fig. 6.)

MESEMBRYANTHEMUM MULTIPUNCTATUM Nob.

MESEMBRYANTHEMUM multipunctatum; subacaule ramosissimum, foliis vaginato-connatis elongatis semiteretibus apice carinatis obtusis, subglaucescenti-perviridibus punctis numerosissimis pellucidis prominulis; scapo elongato ebracteato; calyce 4-fido.

M. multipunctatum; caule ramuloso brevi; foliis rostrato-connatis glaucescenti-viridibus multipunctatis, uno apice acuto altero dilatato obtuso; scapo ebracteato elongato, flore luteo; calyce 4 fido; stigmata 10. Nob. Hort. Dyck. p. 357.

RADIX sublignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS nullus aut aetate brevis, ramosissimus, foliorum vaginis desiccatis vestitus.

FOLIA 4 - 6 in apice ramulorum collecta, carnosa, elongata, obtusa, basi vaginata, poll. 2 cum dimidio longa et lin. 3 basi ad vaginas lata; duo juniora longitudine inaequalia, erecta, sibi adpressa, seniora patenti-incurvula, rigidiuscula, perviridia rore glaucescente obducta, vaginis saepe purpurascensibus, multi-punctata; punctis saturatioribus ad lucem pellucidis numerosissimis, validis, prominulis, nitentibus; supra plana basi pustulatogibba, subtus convexa superne carinato-compressa, apice obtusa cum mucronulo uno folio subattenuato altero dilatato, et angulo cardinali producto, imo apice cartilagineo, serrulato.

FLORES terminales, solitarii, longe pedunculati, meridie expansi. Pedunculus aut scapus triplicaris et ultra, teres, viridis cum tinctura rubedinis, nudus.

CALYX hemisphaericus, plerumque quadrisfidus, lacinias duabus latioribus sub apice mucronatis margine membranaceis, duabus angustioribus carinatis.

PETALA subtriserialia, serie interna breviore externa longiore, erecto-recurvula, lanceolata, integra, lutea.


STAMINA numerosa, subcollecta, erecta. Filamenta brevia, flava. Antherae flavidae.

PISTILLUM. Ovarium subglobosum. Styli 8 erecti, subulati, staminibus breviores, flavi, interne subramentacei.

CAPSULA 8 locularis; maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret mensibus Martio, Aprili.

Observ. Haec distinctissima species, in horte Carlsruhano e semine capensi orta, colore viridi a congeneribus omnibus differt. Ceterum proxime accedit ad **M. denticulatum**; sed paulo minor est, et folia magis inaequalia apice serrulata sunt, nec dente uno alterove grandi instructa.



M. postatum.

(§. 3. — Fig. 7.)

MESEMBRYANTHEMUM ROSTRATUM Lin.

MESEMBRYANTHEMUM rostratum; subacaule ramulosum, foliis vaginato-connatis longe attenuato-elongatis subtriquetris acutiusculis glaucescentibus pellucido-gran-dipunctatis; scapo elongato bracteato; calyce 4-5 fido.

α. *longebracteatum*; scapo basi bracteis instructo.

M. rostratum; acaule, foliis subulatis elongatis acutis punctatis, bracteis duabus scapo longioribus, calyce 4 fido. *DC. Prod.* 3. p. 421.

M. rostratum; acaule, foliis subulatis elongatis semiteretibus acutis glaucis praepunctatis: bracteis duabus scapo longioribus. *Haw. Synop.* p. 214. — *Rev.* p. 92.

M. rostratum; acaule, foliis elongatis acutis glaucis obsolete punctatis, scapo bracteisque elongatis. *Haw. Misc. nat.* p. 29. — *Ait. Kew. ed.* 2. vol. 3. p. 217.

M. rostratum; acaule, foliis semicylindricis connatis externe tuberculatis. *Lin. Hort. Cliff.* p. 219. — *Roy. Lugd. bat.* p. 285. — *Mill. Dict.* No. 40. — *Ait. Kew. ed.* 1. vol. 2. p. 191 — *Wüld. Sp. pl.* 2. p. 1027.

M. rostrum ardeae referens. *Dill. Ellh.* p. 240. t. 186. fig. 229. (*sine flore.*)

RADIX sublignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS nullus aut aetate brevis, parum ramosus, foliorum vaginis desiccatis, membranaceis, vestitus.

FOLIA 4-6 in apice ramulorum collecta, carnosa, elongata, subulata, attenuata, basi vaginantia, poll. 4-5 longa et lin. 5-6 basi ad vaginam lata, duo juniora erecta sibi adpressa et formam rostri ardeae simulantia, seniora erecto-recurvula, mollia, laxa, glaucescentia, punctata; punctis ad lucem pellucidis, validis, numerosis, quandoque subprominulis; supra plana basi pustulato-gibba, subtus inferne convexa et superne carinata, apice acutiuscula cum mucronulo, angulo cardinali praecipue apicem versus subcartilagineo, subdenticulato.

FLORES solitarii, longe pedunculati, meridie expansi. **Pedunculus** aut scapus quadripollucaris, teres, viridis, apice paulo incrassatus, basi bracteis duabus instructus. **Bracteae** foliiformes scapi longitudinem adaequantes.

CALYX hemisphaericus, plerumque quadrifidus, quandoque quinquefidus, laciniis duabus latioribus margine membranaceis, duabus aut tribus angustioribus subcarinatis.

PETALA triserialia, serie interna breviore externa longiore, erecto-recurvula, lanceolata, integra, lutea.

STAMINA numerosa, collecta, erecta. **Filamenta** brevia, flava. **Antherae** flavidae.

PISTILLUM. **Ovarium** subglobosum. **Styli** 8-10 erecti, subulati, staminibus breviores, flavidi, interne subramentacei.

CAPSULA 8-10 locularis; maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret mense Martio et Aprili.

Observ. Antiqua species, jam anno 1732 in Anglia apud Jacobum Sherard culta. Rarissime floret, sicut plantae omnes hujusce sectionis. A *M. multipunctato* et a praecedentibus foliis longissimis omnino subulato-attenuatis facilime distinguitur. Varietas *tuberculata*, huic speciei a Cl. Haworth adscripta, nec constans nec notatu digna est.



M. rostratum brevibracteatum.

(s. 3. — Fig. 73.)

(§. 3. Fig. 7. β.)

MESEMBRYANTHEMUM ROSTRATUM β. *brevibracteatum* Nob.

MESEMBRYANTHEMUM *rostratum* β. *brevibracteatum*; foliis glaucioribus; scapo ad medium bracteis instructo.

M. *bibracteatum*; subacaule ramosum; foliis subulatis elongatis punctatis perglaucis; bracteis quatuor decussatis scapo brevioribus, calyce quinquefido. DC. Prod. 3. p. 420.
— Haw. Synop. p. 213. — Rev. p. 92.


RADIX, CAULIS, FOLIA, ut in specie.

FLORES ut in specie. Scapus quadripollicaris medium versus bracteis duabus instructus. Bractae subfoliiformes, scapo multo breviores.

CALYX plerumque quinquesfidus.

PETALA, STAMINA, PISTILLUM, CAPSULA; ut in specie.

Observ. Cl. Haworth duo folia summa, e quibus scapus oritur, pro bracteis habuit, et inde scapum bibracteatum dixit; at vera sunt folia, paulo minora quidem, ramulorum novorum autem rudimenta involventia. Discrimen ergo unicum inter **M. rostratum** et **bibracteatum** Haw. est bractearum insertio, et quia illae plantae caeterum omnino similes sunt, vix colore plus minusve glauco distinguendae, eas coniunxi; attamen icone propria hanc varietatem illustrare volui.



M. tigrinum.

(§. 5. — Fig. 1.)

MESEMBRYANTHEMUM TIGRINUM Haw.

MESEMBRYANTHEMUM tigrinum; subacaule, foliis triquetris ovato-rhombeis glaucescenti - perviridibus albo - marmoratis laevibus, subtus carinato - convexis, angulo carinali integerrimo apice producto, lateralibus grandidentatis, dentibus confertissimis longissime ciliatis.

M. tigrinum; acaule virescens, foliis amplexicaulibus cordato - ovatis expansis albo - marmoratis longe ciliatis supra planis, apice cartilagineo - carinatis, flore sessili. DC. Prod. 3. p. 419.

M. tigrinum; virescens, acaule: foliis (amplexicaulibus) cordato - ovatis expansis, albo crebre marmoratis altissime ciliatis: supra planis, apice cartilagineo - crenatis. Haw. Rev. p. 89.

M. tigrinum; acaule, foliis glaucescentibus albo - maculatis rarius tuberculatis, marginibus profunde ciliatis. Haw. in Miscel. nat. p. 31. — Synop. p. 216. — Ait. Kew. ed. 2. vol. 3. p. 218. — Bot. Reg. t. 260.

M. tigrinum; acaule, foliis maculatis oblongis subtus convexis apice ciliato - dentatis, flore sessili. Willd. Sp. pl. 2. p. 1029.

M. tigrinum; acaule foliis maculatis ciliatisque, ciliis longissimis. Haw. Mesembry. p. 164. No. 36.

RADIX sublignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS nullus, aut aetate brevis, parum ramosus, foliorum rudimentis desiccatis obsitus.

FOLIA conferta, decussata, erecto - patentia, valde carnosa, subrigida, sesquipolligem longa et lin. 11-12 medio lata, rhombeo-dilatata, basi angustata apice subacuta; opaca, glaucescenti - perviridia, utrinque maculis albis sparsis, aut in lineas confluentibus pulcherrime marmorata; supra plana, subtus triquetro - convexa, superne incrassata, angulo carinali producto - gibboso, integerrimo; angulis lateralibus (ima basi integerrima) dentatis, dentibus in singulo latere 10-12, confertis, subulatis, validis, albis, in cilium longam exeuntibus, retrorsum flexis.

FLORES solitarii, subsessiles, magni, post meridiem expansi, inodores.

CALIX turbinatus quinquesfidus, lobis inaequalibus, ad margines submembranaceis, apice varie carinato - gibbis.

PETALA bi vel triseritalia lanceolata, acuta, patento - recurvata, croceo - flava.


STAMINA numerosa, conferta, erecta. Filamenta albo - lutea. Antherae croceo - flavae.

PISTILLUM. Ovarium turbinatum, supra conicum. Styli 5 subulati, erecto - recurvuli, staminibus paulo longiores.

CAPSULA subglobosa, quinquelocularis.

Habitat in Prom. b. spei. Floret a mense Septembri ad Decembrem.

Observ. Hanc speciem advexit in Angliam cl. Masson anno 1790. A caeteris omnibus foliis latissimis, albo - marmoratis, longissimeque ciliatis differt.



M. f. Linum.

(§. 5. — Fig. 2.)

MESEMBRYANTHEMUM FELINUM Lam.

MESEMBRYANTHEMUM felinum; subacaule, foliis triquetris lanceolato-rhombeis glaucescenti-laeteviridibus obsoletissime albo-maculatis laevibus, subtus carinato-convexis angulo carinali integerrimo apice producto, lateralibus quadridentatis, dentibus remotis ciliatis.

M. felinum; acaule glaucescens; foliis alte ciliato-dentatis obsoletissime punctatis; apicibus cartilagineo-carinatis. *Haw. Rev.* p. 89. — *DC. Prodr.* 3. p. 419.

M. felinum; acaule, foliis glaucescentibus, marginibus ciliato-dentatis, apicibus cartilagineis. *Haw. Misc. nat.* p. 31. — *Synop.* p. 216. — *Ait. Kew. ed.* 2. p. 218.

M. felinum; acaule, foliis punctatis oblongis subtus convexis, apice dentatis, dentibus acuminatis, flore sessili. *Willd. Sp. pl.* 2. p. 1028.

M. felinum; acaule, foliis subtus semicylindricis ciliatis, ciliis longis. *Haw. Mesembr.* p. 161. No. 35.

M. felinum; acaule, foliis obsolete triquetris punctatis, angulis internis dentato-ciliatis, floribus sessilibus. *Lam. Ency.* 2. p. 486. No. 46. — *DC. Pl. grass.* t. 152.

M. ringens β. **felinum** *Lin. Sp. pl.* p. 298.

M. rictum felinum repraesentans. *Dill. Ethn.* p. 240. t. 187. fig. 230. — *Knorr. Del.* 1. t. 6. b. n. 1.

FICOIDES afra, folio triangulari ensiformi crasso brevi ad margines laterales multis majoribus spinis aculeato. *Marl. Cent.* 30. t. 30.

RADIX sublignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS nullus aut aetate brevis, parum ramosus, foliorum rudimentis desiccatis obsitus.

FOLIA decussata, recurvato-expansa, carnosa subrigida, sesquipollicem longa et lin. 6-9 medio lata, subrhombeo-dilatata, basi paulo angustata, apice subacuta; opaca, glaucescenti-laeteviridia, subtus praecipue punctis albidis, sparsis, ad carinam confluentibus obscure notatis; supra plano-convexa, subtus convexo-triquetra, superne incrassata angulo carinali producto, gibboso, integerrimo; angulis lateralibus inferne integerrimis, a medio ad apicem dentatis, dentibus in singulo latere 3-5 remotis, subulatis validis, in ciliam exentibus, retrorsum flexis.

FLORES solitarii, subsessiles, magni, post meridiem expansi, inodori.

CALYX subglobosus, quinquefidus, lobis inaequalibus, ad margines submembranaceis, apice varie carinato-gibbis.

PETALA bi-vel triserialia, lanceolata, acuta, patento-recurvula, croceo-flava.


STAMINA numerosa, conferta, erecta. Filamenta albido-lutea. Antherae croceo-flavae.

PISTILLUM. *Ovarium globosum. Styli 5 subulati, erecto - recurvuli, staminibus paulo longiores.*

CAPSULA *globosa, quinquelocularis.*

Habitat in Prom. b. spei. Floret a mense Septembri ad Decembrem.

Observ. Haec antiquior hortorum incola, jam anno 1730 culta, a *M. tigrino* differt foliis angustioribus, vix albo-marmoratis et ad angulos laterales dentibus crassioribus, sed multo rarioribus instructis.





M. mustellinum.

(S. 5. — Fig. 5.)

MESEMBRYANTHEMUM MUSTELLINUM Nob.

MESEMBRYANTHEMUM mustellinum; subacaule ramulosum, foliis triquetris apicem versus latioribus obtusis virescentibus pellucido-papulosis basi intus pustulato-gibbis, angulo carinali dilatato integerrimo, lateralibus superne aculeato-dentatis.

M. mustellinum; subacaule virens pellucido-punctatum, foliis triquetris superne sensim incrassatis breve ciliato-dentatis, basi intus pustulato-gibbis, floribus breviter subpedicellatis, calyce 4-fido. DC. Prod. 3. p. 419.

M. mustellinum; subacaule virescens pellucenter magni-punctatum: foliis elevato-triquetris; superne ciliatim brevidentatis, basi intus pustulato-gibbosus. Haw. Revis. p. 89.

M. mustellinum; subacaule; foliis triquetris virescentibus superne sensim incrassatis, ciliato-dentatis. Haw. Suppl. p. 87. — Nob. Obs. bot. 1820. p. 9.

RADIX sublignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS brevis; valde ramosus, ramulis prostratis, foliorum rudimentis desiccatis onustis.

FOLIA decussata, erecto-patentia, carnosa, subrigida, lin. 8-10 longa et lin. 4-5 superne lata, spathulato-dilatata, obtusa; virescentia, nitida, punctis prominulis seu papillis validis, ad lucem pellucidis rugulosa, supra planiuscula ima basi pustula grandi instructa, subtus convexo-triangulari angulo carinali dilatato, gibboso, integerrimo; angulis lateralibus a basi ad medium integris, superne denticulatis, dentibus in singulo latere 5-7 parvulis, acutis, vix retrorsum flexis.

FLORES solitarii, parvuli, breve pedunculati, vespere expansi, suave fragrantes.

CALYX turbinatus quinquesfidus, lobis inaequalibus duobus carinatis denticulatis, tribus integris acutis.

PETALA multiserialia, numerosa, brevia, setacea, lutea.

STAMINA parum numerosa, erecta. Filamenta albido-lutea. Antherae flavidae.

PISTILLUM. Ovarium turbinatum supra conicum. Styli 5 abbreviati, subglobosi, viriduli.

CAPSULA quinquelocularis; maturam non vidi.

Habitat in Prom. b. spei. Floret a mense Augusto ad Octobrem.

Observ. Hanc speciem Anno 1814 Vindobonae in hortulo Caesareo, e semine capensi ortam et absque nomine cultam, reperi, et illam cl. Haworth sub nomine *M. mustellini* communicavi. A *M. murino* valde differt foliis retusis, virescentibus, grosse papulosis, nitentibus, ad carinam integerrimis.



M. ermininum.

(§. 5.—Fig. 6.)

(§. 5. Fig. 6.)

MESEMBRYANTHEMUM ERMININUM Haw.

MESEMBRYANTHEMUM ermininum; subacaule ramulosum, foliis triquetris apicem versus parum latioribus obtusiusculis glaucis crebre pellucido-punctatis, angulo carinali integerrimo subdilatato, lateralibus superne aculeato-dentatis.

M. ermininum; subacaule: glaucum: foliis rugoso-magnipunctatis: marginibus superne brevidentatis, carina integra. *Haw. Phil. Mag. et Journ. August 1826. p. 126.*

RADIX sublignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS brevis, valde ramosus, ramulis prostratis, foliorum rudimentis desiccatis onustus.

FOLIA decussata, erecto-patentia, carnosa, subrigida, lin. 8-9 longa et lin. 3-4 superne lata, obtusiuscula, basi vix angustiora, glauca, punctis permultis prominulis ad lucem pelluentibus rugosa; supra planiuscula, subtus convexo-triquetra angulo carinali integerrimo vix gibboso; angulis lateralibus a basi ad duas tertias integris, apice denticulatis, dentibus in singulo latere 3-4 parvulis, acutis, rectis.

FLORES solitarii, parvuli, breve pedunculati, vespere expansi, suave fragrantes.

CALYX turbinatus, quinquesfidus, lobis inaequalibus, elongatis, obtusiusculis.

PETALA multiserialia, numerosa, setacea, lutea apice rubicunda.


STAMINA parum numerosa, erecta. Filamenta lutea. Antherae pallidae.

PISTILLUM. Ovarium turbinatum, supra conicum. Styli 5 parvuli, erecti, incurvuli, obclavati, viriduli.

CAPSULA 5 locularis. Maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret a mense Augusto ad Octobrem, et quandoque Aprili.

Observ. Haec species, anno 1825 in horto Kewensi jam culta, a *M. mustellino* differt foliis angustioribus perglauca, basi intus grandipunctatis, nec gibboso-tuberculatis.



M. minutus curlinum.

(§.5.—Fig. 7.)

(§. 5. Fig. 7.)

MESEMBRYANTHEMUM MUSCULINUM Haw.

MESEMBRYANTHEMUM *musculinum*; subcaulescens, sarmentosum, foliis aequilateri-triquetris glaucescenti-viridibus pellucido-punctatis, punctis prominulis basi intus pustulato-gibbis, ad angulos superne paudentatis.

M. *musculinum*; foliorum capitatorum marginibus carinaque subunidentigeris, ramis prostratis subsemipedalibus. *Haw. Phil. Mag. et Journ. 1826. p. 328.*

RADIX sublignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS ramosus, ramulis semipedalibus, sarmentosis, angulatis, foliorum rudimentis desiccatis onustus.

FOLIA secus ramos juniores remotiuscula, aut in vetustioribus capitato-collecta, vaginato-connata, erecto-patentia, in aut recurvula, rigidiuscula, lin. 8-9 longa et lin. 2-3 lata, subaequilateri-trigona, obtusiuscula, glaucescenti-laeteviridia, nitida, punctis prominulis validiusculis ad lucem pelluentibus scabrida; supra convexiuscula, ima basi pustula grandi instructa, subtus triquetro-compressa, ad angulos apice solum dentata, dentibus 1-2 minimis, acutis, rectis.

FLORES solitarii, breve pedunculati, parvuli, post meridiem expansi, inodori.

CALYX subturbinatus, quinquefidus, lobis subaequalibus latiusculis.

PETALA subuniserialia, parum numerosa, brevia, latiuscula, lanceolata, lutea apice rubicunda.


STAMINA parum numerosa, erecta. Filamenta et Antherae flavidæ.

PISTILLUM. Ovarium subturbinatum, supra convexiusculum. Styli 5 filiformes erecti, apice recurvuli, viridiuersculi, staminibus longiores.

CAPSULA 5 locularis; maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret a mense Julio ad Septembrem.

Observ. Ramulis elongatis prostratis sarmentosis a caeteris *Ringentibus* abunde differt haec species, quae in horto Kewensi, e semine capensi enata, anno 1826 primo floruit.





M. scapiger.

(§. 6. — Fig. 1.)

MESEMBRYANTHEMUM SCAPIGER Haw.

MESEMBRYANTHEMUM scapiger; acaule, foliis distinctis decussatis elongatis erecto-patentibus carinato-triquetris glaucescenti-viridibus laeviusculis parvipunctatis, angulis integris carinali superne valde compresso producto, scapo ancipi.

M. scapiger; subacaule, foliis carinato-triquetris viridibus margine punctisque asperiusculis, scapo valido ancipi bracteato subpaniculato. *DC. Prod. 3. p. 423.*

M. scapiger; foliis carinato-triquetris viridibus margine punctisque asperiusculis: scapo valido subpaniculato ancipi. *Haw. in Phil. Mag. Decemb. 1824. p. 423.*

RADIX centralis crassa fusiformis, laterales ramosi, fibrosi.

CAULIS nullus.

FOLIA 10-12 radicalia, distincta, decussatim-opposita, duo juniora sibi adpressa, seniora erecto-patentia, indurata, subrigida, plerumque stricta, poll. 3-4 longa et lin. 5-7 basi lata, supra plana sensim attenuata, subtus carinata lateribus a basi ad medium convexiusculis, et a medio ad apicem valde compressis, glaucescenti-perviridia, opaca, vix rugulosa, punctis minutis creberrimis parum prominulis et ad lucem subpellucidis, ad angulos integra laeviuscula, imo apice cartilaginea, mucronata, inaequalia, uno folio subattenuato recurvulo, altero incurvulo dilatato, angulo carinali producto.

FLORES ternati aut quinati, uno alterove saepe abortivo, pedicellati in scapum incidentes, vespere expansi. **Scapus** poll. 2-3 longus et lin. 3-4 latus, alato-anceps, superne bracteatus, bracteis connatis, maxime compressis, subfoliiformibus, abbreviatis, decurrentibus, e quibus oriuntur pedicelli tres, fere poll. 2 longi, compressi, superne incrassati, intermedio nudo, semper unifloro floreque praecociore, lateralibus quandoque bifloris ad medium bracteis duabus minoribus connatis, carinatis, acutiusculis instructis.

CALYX in pedicellum attenuatus, laevis, profunde quinquefidus; laciis lanceolato-acuminatis, superne carinulatis, expansis, duabus margine submembranaceis.

PETALA pluriserialia, lanceolato-acuminata, integerrima, erecto-expansa, laciis calycinis longiora, intus lutea extus rosea.


STAMINA conferta, erecta. Filamenta et Antherae luteae.

PISTILLUM. Ovarium obconicum, supra convexiusculum. Styli 5 filiformes erecti, apice recurvuli, staminum longitudine, lutei.

CAPSULA 5-locularis; maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret mensibus Julio et Augusto.

Observ. Haec pulcherrima et distinctissima species a Dom. Bowie a Promontorio bonae spei in Angliam advecta fuit, anno circiter 1824. A *M. carinanti* et *dolabriformali* valde differre videtur; sed hisce speciebus inflorescentia omnino accedit, et foliorum forma in sectione *Dolabriformalium* non characterem praecipuum efficit.





M. semicylindricum.

(S. 7.—Fig. 2.)

MESEMBRYANTHEMUM SEMICYLINDRICUM Haw.

MESEMBRYANTHEMUM semicylindricum; subcaulescens ramosum, foliis decussatis connatis turgido - semicylindraceis bullato - punctatis nitidis, valde inaequalibus medio supra uno altero tuberculo carnosus instructis, apice subcompressis obtusis, flore pedunculato.

M. semicylindricum; subcaulescens, foliis angustissime linguaeformibus semiteretibus apicem versus obliquis uno dente obsoleto altero munitis, floribus breviter pedicellatis, calyce 4-fido. *DC. Prod. 3. p. 423.*

M. semicylindricum; foliis angustissime linguaeformibus semiteretibus, apicem versus obliquis, uno dente obsoleto altero munitis; caudice senecto ramoso semipedali; capsula depressa. *Haw. Rev. p. 103.*

M. semicylindricum; foliis semiteretibus, apicem versus obliquis et uno altero dente munitis, caule ramoso adscendente semipedali. *Haw. Synop. p. 225.*

M. difforme; subacaule, foliis punctatis lanceolatis semiteretibus margine difforme cordatis, basi connatis. *Willd. Sp. pl. 2. p. 1031?*

M. difforme; acaule foliis difformibus punctatis connatis. *Lin. Sp. pl. 699. Lam. Ency. 2. p. 487.*
No. 49. — Ait. Kew. 2. p. 195?

M. foliis diffimibus, flore luteo. *Dill. Elth. p. 252. Fig. 242. (excl. Fig. 241.) Roy. Lugd. bat. p. 287?*

RADIX sublignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS semipedalis et ultra parum crassus, suberectus, strictus, rigidus, subbifurcatus ramosus, foliorum rudimentis desiccatis onustus.

FOLIA in apice ramorum collecta exacte decussata, erecto-incurvula, carnosa, basi vaginato-connata vaginis crassis, per paria longitudine inaequalia, uno poll. 2 et ultra, altero lin. 12-15 longa, et lin. 3-4 ambo lata, turgido-subcylindracea, subpellucido-punctata, bullulata, glaberrima, nitida, laeteriridia basi et apice saepe purpurascens; supra, a basi ad medium sere, planiuscula et ibi uno tuberculo aut dente carnosus, grosso, obtuso, parum prominulo, altero munito; subtus farctim convexa, superne subcompressa, obsoleta carinata, imo apice diversa folio longiore carinatum producto, altero subulato, obtusiusculo cum mucronulo.

FLORES solitarii primo centrales, mox laterales, meridie expansi, pedunculati. Pedunculus pollicaris superne incrassatus.

CALYX turbinatus, bullulatus, quadrididus; laciniis duabus productis carinato-gibbis, duabus brevioribus margine membranaceis.

PETALA uniserialia, elongata, patenti-recurvula, integra, lutea.


STAMINA parum numerosa, erecta. Filamenta brevia, lutea. Antherae flavae.

PISTILLUM. *Ovarium turbinatum supra convexum. Styli 8 breves, erecto-patentes, subramentacei, flavi.*

CAPSULA *turbinata, octolocularis. Maturam non vidi.*

Habitat in Prom. b. spei. Floret a mense Junio ad Septembrem.

Observ. Cl. Dillenius, qui hanc plantam e semine educavit, illam pro Plukenetii *Mesembryanthemo crassissimo et valde succulento folio, nigris punctulis notato* habuit, et Linneus, Royen, Lamarck, Widenow hanc sententiam secuti sunt: erroneo attamen; ut e comparatione Dillenii iconum, primo intuitu, patet. Cl. Haworth primus has icones (imperfecte sculptas) separavit; sed, errore altero, Fig. 241 (evidenter ad *M. bidendatum* referendam) *M. semicylindrico*, et Fig. 242 *M. difformi* tribuit. Haec ultima vero, propter caulem erectum, valde ramosum, foliaque uno alterove dente munita, mihi magis ad *M. semicylindricum* quam ad *M. difformem* spectare videtur. Dillenius p. 252 et 253 preterea dicit folia esse tuberculato-punctata, et eorum superficies veluti inaequalis; character in hacce Sectione praecipuus, et solo *M. semicylindrico* conveniens. Dubitanter attamen synonyma *M. difformi* tributa ad hanc speciem referto.





M. difforme.

(§. 7. — Fig. 3.)

(§. 7. Fig. 3.)

MESEMBRYANTHEMUM DIFFORME Haw.

MESEMBRYANTHEMUM difforme; subcaulescens subramosum, foliis oblique decussatis connatis semitereti-linguaeformibus angustis laevissimis punctatis nitidis, valde inaequalibus uno apice carinatim peraucto, altero abbreviato obtusiusculo, flore pedunculato.

M. difforme; subacaule, foliis oblique cruciatis longis semicylindraceis obliquis, apice dentibus 1-2 obscuris munitis, floribus subsessilibus, calyce 4-fido. DC. Prod. 3. p. 422. (excl. Synon. Dill.)

M. difforme; foliis oblique cruciatis longis apicem versus varianter oblique difformibus, denteque uno alterove obscuro munitis: caudice senecto 3-6 unciali. Haw. Rev. p. 103.

M. difforme; foliis linearis-linguaeformibus semicylindraceis oblique cruciatis, apicibus deformibus, caule senecto ramoso semipedali. Haw. Synop. p. 225. — Ait. Kew. ed. 2. vol. 3. p. 220. (excl. Synon. Dill.)

RADIX sublignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS aetate quandoque semipedalis, crassus, basi suberosus, decumbens aut prostratus, parum ramosus, superne cicatratus aut foliorum rudimentis onustus.

FOLIA in apice ramorum collecta, oblique decussata, subdeclinata, erecto-recurvula, carnosa, basi vaginato-connata, subpellucido-punctata, laevia, nitidula, pallideviridia, per paria longitudine inaequalia, uno poll. 3 et altero poll. 2 cum dimidio longa, et lin. 6-7 ambo lata; breviora sublinguaeformia, uno latere crassiora, apice obtusiuscula cum mucronulo; longiora supra a basi ad $\frac{2}{3}$ plana et ibi impressione folii brevioris oppositi excavata lineaque prominula notata, sed nunquam tuberculo aut dente munita, apice longe producta, compressa, oblique carinata, obtusa.

FLORES solitarii primo centrales mox laterales, meridie expansi, pedunculati. **Pedunculus** pollicaris subtuberculatus.

CALYX turbinatus, quadrisfidus lobis duobus productis, carinatis, acutis; duobus brevioribus margine membranaceis.

PETALA uniserialia, elongata, angusta, distantia, patenti-recurvula, integra, lutea.


STAMINA numerosa, erecta. **Filamenta** brevia, lutea. **Antherae** flavae.

PISTILLUM. Ovarium turbinatum supra convexum. **Styli** 8-9 breves patentes, ramentacei, flavi.

CAPSULA octo aut novemlocularis; matura obconica.

Habitat in Prom. b. spei. Floret a mense Junio ad Septembrem.

Observ. Haec est planta quam cl. Haworth sub nomine *M. difformis* descriptis, et quae omnino a *M. bidentato* et *semicylindrico* differt. Dillenii Fig. 242 ac descriptio huic speciei vix referri possunt; folia, multo longiora ac planiora, laevissima sunt, et nunquam bullulata, nec dente aut tuberculo carnoso instructa. Caulis quoque crassior est, strulosus, minus ramosus, et semper humi procumbens. Adest varietas caule breviore vix tripolllicari.





M. a c u t u m.

(§.13.—Fig. 1.)

(§. 13. Fig. 1.)

MESEMBRYANTHEMUM ACUTUM Haw.

MESEMBRYANTHEMUM acutum; subacaule, foliis decussatis connatis semicylindricis apice triquetris acutiusculis subglaucescenti-perviridibus, punctis minutissimis pelluentibus laevissime rugosis; floribus longe pedunculatis, pedunculis basi bracteatis.

M. acutum; acaule, foliis semicylindricis acutis viridibus pellucido-punctatis minime rugosis.
DC. Prod. 3. p. 425.

M. acutum; foliis exakte semicylindricis pellucenter ad lucem obsolete punctatis, minime rugulosis. *Haw. Rev. p. 107.*

M. acutum; acaule, foliis subulatis acutis viridibus, apice triquetris, corolla rubicunda.
Haw. Synop. p. 207. — Miscel. nat. p. 26. — Ait. Kew. ed. 2. vol. 3. p. 215.

M. subulatoides. *Haw. Mesembr. No. 25. p. 141.*

M. subrostratum; subacaule; foliis semicylindricis connatis apice trigonis acutiusculis, interne tenuissime tuberculatis. *Willd. Enum. p. 529. (excl. Syn. M. rostratoides Haw. quod ad M. ramulosum pertinet.)*

RADIX sublignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS nullus, aut aetate brevissimus, ramosus.

FOLIA decussata, conferta, basi connata, erecto-recurvula, poll. 2 cum dimidio longa et lin. 4-5 basi lata, sensim attenuata, supra plana, subtus inferne convexa, superne carinata, angulis integris quandoque laeve cartilagineis, imo apice acutiuscula cum mucronulo; subglaucescenti-perviridia, nitidula punctisque creberrimis minutissimis, obsolete prominulis, ad lucem pelluentibus rugulosa.

FLORES rite ternati, sed abortu geminati aut solitarii, ante meridiem expansi, longe pedicellati. Pedicelli poll. 3 longi, teretes, basi bracteati, et in pedunculum communem brevem, compressum affixi. Bracteae parvulae acutae.

CALYX hemisphaericus, quinquefidus, laciinis subaequalibus, acutis, carinatis, duabus margine membranaceis.

PETALA uniserialia, latiuscula, patento-recurvula, apice serrulata, laete purpurea, laciinis calycinis duplo longiora.


STAMINA numerosa, pistillum tegentia. Filamenta tenuissima, alba. Antherae pallide flavicantes.

PISTILLUM. Ovarium globosum. Styli 8-12 subulati, patento-recurvuli, breves, subramentacei.

CAPSULA 8-12 locularis; maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret mensibus Aprili et Majo.

Observ. Haec pulchra species, jam anno 1793 in Anglia culta, raro floret. Cl. Widenow eam sub nomine **M. subrostrati** prope **M. rostratum** locavit; sed longissime a tota **Rostratorum** sectione recedit, et propriam cum **M. diminuto** constituere debet.





M. tricolorum.

(§.15.—Fig. 7.)

MESEMBRYANTHEMUM TRICOLORUM Haw.

MESEMBRYANTHEMUM tricolorum; caule procumbente ramoso, foliis connatis elongatis exacte cylindraceis calamiformibus obtusiusculis cum mucronulo patent-erectis laeteviridibus, filamentis purpurascensibus, antheris fuscis.

M. tricolorum; caulibus prostratis, ramulis distantibus, foliis exacte cylindraceis acutis viridibus, stigmatibus 20 brevibus expansis. *DC. Prod. 3. p. 426.*

M. tricolorum; foliis exacte cylindraceis tripollicaribus acutis viridibus, petalis basi purpureis, stylis viginti. *Haw. Revis. p. 111. — Synop. p. 232. — Miscel. nat. p. 39. — Ait. Kew. ed. 2. vol. 3. p. 223.*

M. tricolorum; foliis longissimis connatis cylindricis, caule procumbente angulato, floribus polygynis. *Haw. Mesemb. p. 233. No. 65.*

M. stramineum; foliis teretibus obtusis connatis punctatis, caule procumbente angulato, floribus polygynis. *Willd. Enum. p. 533. No. 36.*

RADIX lignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS pedalis ramique lignosi, decumbentes, flexuosi, crassitie pennae columbinæ, primo cylindracei saepe rosei, dein angulati cortice stramineo, nodosi, internodiis elongatis.

FOLIA subconferta, connata, subvaginantia, omnino cylindracea, juniora basi patentia, dein incurvo-erecta apice recurvula, seniora expansa, obtusa cum mucronulo purpurascente, poll. 2-3 longa, diametro 2-3 linearis, laevissime punctata, glaucescenti-laeteviridia saepe rubro picta.

FLORES in ramulis floriferis terminales, abortu plaerumque solitarii, meridie expansi, pedunculati. **Pedunculus** basi bracteis duabus instructus, brevis, teres.

CALYX depresso-globosus, quinque- aut quadrifidus; laciniis duabus aut tribus elongatis acutis, duabus margine membranaceis sub apice mucronatis.

PETALA uniserialia expansa, anguste-lanceolata acuta, lutea ima basi purpurea et apice subtus rubicunda, laciniis calycinis duplo longiora.

STAMINA erecta, petalis quibusdam brevioribus rubicundis circumdata. **Filamenta** purpurea. **Antherae** fuscæ.

PISTILLUM. Ovarium sphaeroideum, supra convexiusculum. **Styli 18-20** radiatim expansi, ovario adpressi, obtusi, ramentacei, lutei.

CAPSULA 18-20-locularis centro depressa; maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret a mense Octobri ad Aprilem.

Observ. Haec species jam ante annum 1794 a cl. Haworth culta fuit, et nomen **M. tricoloris** ab illo impositum prioritatis causa servandum est. Proxime accedit ad **M. procumbentem**; sed differt foliis omnino cylindraceis, petalis basi sanguineis, filamentis purpureis et antheris fuscis.





M. validum.

(§. 15. — Fig. 8.)

(§. 15. Fig. 8.)

MESEMBRYANTHEMUM VALIDUM Haw.

MESEMBRYANTHEMUM validum; caule procumbente ramoso, foliis connatis elongatis basi semiteretibus superne triquetro-compressis apice obtusiusculis cum mucrone erectis viridibus, stigmatibus miniatis.

M. validum; foliis longis pallide viridibus margine asperiusculo, ramis robustis rigidis decumbentibus, floribus subternatis, bractearum carinis integris. *Haw. in Phil. Mag. Novemb. 1826. p. 329.*

RADIX lignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS bipedalis et ultra, ramique decumbentes, crassitie pennae anserinae, flexuosi, rigidi, primo cylindracei virides, dein angulati cortice cinereo-fusco, nodosi, internodiis brevibus.

FOLIA conferta, connata, subvaginantia, basi semicylindracea, superne subtriquetro-compressa, incurvato-erecta, apice obtusula cum mucrone, polt. 2-3 longa et basi tin 3-4 lata, sensim attenuata, laevissime punctata, viridia, nitida, basi quandoque purpurascentia.

FLORES in ramulis floriferis terminales, abortu saepe solitarii, meridie expansi, pedunculati. Pedunculus sub medio bracteis duabus instructus, poll. 2-3 longus, teres.

CALYX depresso-globosus, validus, quinquefidus, laciniis subaequalibus, tribus acutiusculis, duabus margine membranaceis sub apice mucronatis.

PETALA subuniserialia, erecto-expansa, lanceolata, acutiuscula, lutea, laciniis calycinis duplo longiora.


STAMINA erecta. Filamenta et Antherae luteae.

PISTILLUM. Ovarium validum, sphaeroideum, supra convexum. Styli 17-20 radiatim expansi, ovario adpressi, flexuosi, ramentacei, ochracei.

CAPSULA 17-20-locularis centro depressa; maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei Floret a mense Octobri ad Aprilem.

Observ. Cl. Haworth qui hanc speciem anno 1826 in horto Kewensi e seminibus capensis enatam vidit, illam erroneo prope *M. rigidicaulem* locavit. Characteres omnes Sectionis *Corniculatorum* praebet, et a *M. tricolore* differt caule foliisque validioribus, staminibus flavicantibus, stylisque ochraceo-miniatis.





M. gemmiflorum.

(s. 17. — FIG. 4.)

MESEMBRYANTHEMUM GEMINIFLORUM Haw.

MESEMBRYANTHEMUM *geminiflorum*; caule fruticoso diffuso, ramis gracilibus subsarmentosis; foliis vaginato-connatis, erecto-patentibus aequilateri-triquetris apice acutis recurvulis ad angulos scabriuscis; pedicellis bigeminis ternisve basi et medio bracteatis.

M. geminiflorum; caule fruticoso diffuso, ramis elongatis gracilibus reptantibus, foliis subaequilateri-triquetris oppositis subconnatis acuto-subaduncis punctatis, pedicellis geminis ternisve, stigmatibus 5. DC. Prod. 3. p. 427.

M. geminiflorum; ramis elongatis gracilibus, effuso valde reptantibus: foliis subaequilateri-triquetris viridibus, apice extus adunculis; floribus ternatis geminatisve. Haw. Rev. p. 114.

M. geminatum. Jacq. Fragm. t. 50.

RADIX lignosa, fibrosa.

CAULES 2-3 pedales, diffusi, ranique crassitie pennae columbinæ, compressi, suberecti aut decumbentes, inferne nudi, nodulosi, superne foliosi, ad foliorum vaginas radicantes, primo herbacei, dein lignosi cortice griseo.

FOLIA basi vaginato-connata, juniora erecto-patentia, seniora patentissima, varie in aut recurvula, aequilateri-triquetra, poll. 2 longa et lin. 2 basi lata, sensim attenuata, laete viridia saepe purpureo maculata, tenuissime pellucido-punctata, ad angulos laeve denticulato-serrata, apice mucronulata et uncinato-recurvata.

FLORES terminales parvuli, rite bigeminati cum intermedio tertio brevius pedicellato, sed abortu saepe ternati aut quandoque solitarii, ante meridiem expansi, pedicellati. Pedicelli lin. 13 longi basi et medio bracteati, superne incrassati, in pedunculum communem sesquipollicarem, compressum, geminatim affixi. Bracteae lanceolatae, parvulae, vaginatim connatae.

CALYX quinquesfidus, laciniis aequalibus, obtusiusculis.

PETALA uniserialia, vix lin. 3 longa, lanceolata, pallide rosea, linea saturatiore medio notata.


STAMINA collecta. Filamenta brevia, rosea, basi laevissime barbata. Antherae luteae.

PISTILLUM. Ovarium subglobosum supra hemisphaericum. Styli 5 subulati, recurvato-patentissimi, viriduli.

CAPSULA quinquelocularis; maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret mensibus Aprili et Majo.

Observ. Cl. Jacquin hanc speciem primo in horto Schönbrunnensi observavit et sub nomine *M. geminati* (jam aliae speciei tributo) descriptis. Recenter e seminibus capensibus, a Dom. Ecklon advectis, denuo enata caule ramisque paulo firmioribus minusque diffusis se praebet: an forte varietas *rigidior*? Proxime accedit haec species ad *M. sarmentosum*, et praesertim ad ejus varietatem; sed differt ramis gracilioribus, foliis tenuioribus magisque attenuatis, ad angulos scabridis, et apice recurvulis.





M. clavellatum.

(§. 18. — Fig. 1.)

MESEMBRYANTHEMUM CLAVELLATUM Haw.

MESEMBRYANTHEMUM clavellatum; caule prostrato reptante fragili, foliis recurvato-patentibus viridibus nitidis cylindraceo-triquetris clavatis obtusissimis cum mucronulo, petalis rubicundis basi albis.

M. clavellatum; ramis angulatis reptantibus, foliis confertis expansis obsolete triquetris farctis clavatis obtusissimis mucronulatis viridibus, pedunculo subcompresso, stigmatibus 5 tenuissimis. *DC. Prod. 3. p. 428.*

M. clavellatum; foliis confertis expansis obsolete triquetris farctis clavatis obtusissimis cum mucronulo, viridibus. *Haw. Rev. p. 122.*

M. clavellatum; foliis expansis obsolete triquetris clavatis viridibus obtusissimis cum mucronulo. *Haw. Synop. p. 242. — Miscel. nat. p. 79. — Ait. Kew. ed. 2. vol. 3. p. 241.*

RADIX ramosa, fibrosa.

CAULES humifusi pedales et ultra, vix crassitie pennae columbae, laxi, valde fragiles, remote nodulosi, ad nodos radicantes, ramosi, juniores ramique herbacei supra planiuscula, dein carnosso-sublignosi semiteretes, aut laevissime trigoni, cortice pallide flavescente.

FOLIA in ramis junioribus remota, sed in vetustioribus ad nodos capitatum collecta, basi connata, recurvato-patentia, obsolete triquetra, farcta, lin. 6 - 10 longa et lin. 2 superne lata, inferne attenuata apice obtusissima cum mucronulo tenui parvulo, laete viridia, laevissima, nitida, subpellucido-punctata.

FLORES solitarii e ramulis lateralibus, meridie expansi, pedunculati. Pedunculi nudi teretiusculi, pollicem et ultra longi, superne incrassati.

CALYX turbinatus, carnosus, quinquefidus; lacinias duabus clavellatis foliiformibus, tribus acutis margine membranaceis.

PETALA uniserialia, lanceolata, erecto-recurvata, apice erosula, laete purpurea, ima basi alba.


STAMINA numerosa, erecta. Filamenta albida. Antherae flavidae.


PISTILLUM. Ovarium turbinatum supra convexum. Styli 5 subulati, erecti, flavo-virides, staminibus paulo brevioribus.

CAPSULA 5 locularis; maturam non vidi.

Habitat in nova Hollandia. Floret a mense Aprili ad Junium.

Observ. Hanc speciem legit Cl. R. Brown et anno 1803 in Angliam advecta fuit. Minima est in sectione et foliis clavatis a caeteris speciebus recedit.







M. crassifolium.

(§.18.—Fig. 3.)

MESEMBRYANTHEMUM CRASSIFOLIUM Lin.

MESEMBRYANTHEMUM *crassifolium*; caule prostrato reptante, foliis erecto-patentibus perviridibus laevissimis, obtuse triquetris basi intus gibbis, angulo carinali apice producto, petalis saturate purpureis.

M. crassifolium; caule semitereti reptante, foliis triquetris impunctatis perviridibus laevis basi semicylindraceis, pedunculo subpresso, stigmatibus 5 patentibus. *dc. Prod. 3. p. 427.*

M. crassifolium; foliis triquetris impunctatis laevis perviridibus basi semicylindricis; caule reptante semitereti. *Haw. Synop. p. 241. — Rev. p. 122. — Miscel. nat. p. 78. — Mesemb. p. 350. — Ait. Kew. ed. 2. vol. 3. p. 240.*

M. crassifolium; foliis semicylindricis impunctatis connatis, apice triquetris, caule reptante semicylindrico. *Lin. Hort. Cliff. p. 217. — Spec. pl. ed. 2. p. 693. — Mill. Dict. No. 24. — Lam. Ency. No. 28. — Ait. Kew. ed. 1. vol. 2. p. 188. — Willd. Spec. pl. 2. p. 1047.*

M. crassifolium; caule repente semicylindraceo, foliis semicylindricis laevis connatis apice triquetris. *Lin. Spec. pl. ed. 1. p. 484. — Roy. Lugd.-bat. p. 283.*

M. crassifolium; repens, flore purpureo. *Dill. Ethn. 266. t. 201. fig. 257.*

Ficoides africana reptans folio triangulari viridi, flore saturate purpureo. *Bradl. Succ. 4. p. 16. t. 38.*

RADIX ramosa, fibrosa.

CAULES humifusi, pedales et ultra, crassitie pennae columbinæ, flexiles, nodulosi, ad nodos radicantes, ramosi, juniores ramique herbacei, dein sublignosi teretiusculi, cortice cinereo-fusco.

FOLIA in ramis junioribus subremota sed in vetustioribus ad nodos capitatum collecta, basi connata, erecto-patentia, pollicem longa et lin. 2 lata, inferne semicylindracea, basi intus pustulato-gibbosa, superne triquetra, apice obtusa cum mucronulo, uno folio subattenuato recurvulo, altero angulo carinali dilatato incurvulo, perviridia, laevissima, vix nitida, obsolete pellucido-punctata.

FLORES solitarii terminales, dein axillares, meridie expansi, pedunculati. Pedunculi nudi, teretiusculi, superne incrassati.

CALYX turbinatus, carnosus, quinquefidus; laciinis duabus subfoliiformibus carinatis, tribus acutis margine membranaceis.

PETALA uniserialia, basi attenuata, superne latiuscula, irregulariter erecto-recurvata, apice acuta, saturate purpurea.


STAMINA numerosa, erecta. Filamenta crassiuscula alba. Antherae flavidæ.

PISTILLUM. *Ovarium turbinatum supra convexum. Styli 5 subulati, ramen-tacei, recurvati, flavo-virides, longitudine staminum.*

CAPSULA 5 locularis; maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret aestate et rarissime.

Observ. Haec antiqua species, jam anno 1727 culta et in hortis frequentissima, respectu floris imperfecte cognita est. Dillenii figura 257 *Hort. Elth.* flores exhibet parvulos pe-dunculisque instructos longissimis, saepe bracteatis, quod nec cum planta nostra convenit, nec etiam cum Dillenii descriptione, in qua dicit pedunculos esse breves. Hi pedunculi semper nudi sunt, et flores quoque potius majoribus quam minoribus in hocce genere adnumerari debent. A *M. australi*, praeter patriam diversam, foliis perviridibus basi intus pustulatis, floribusque majoribus saturate purpureis differt.





M. equilaterale.

(§. 49. — Fig. 1.)

MESEMBRYANTHEMUM AEQUILATERALE Haw.

MESEMBRYANTHEMUM aequilaterale; caule angulato debili prostrato; foliis connatis confertis glaucescenti-laeteviridibus aequilateri-triquetris elongatis acutis patentibus incurvulis, ad angulos laevissimis; flore pedunculato hexagyno.

M. aequilaterale; caulibus debilibus prostratis, foliis subaequilateraliter triquetris virescentibus, pedunculo angulato superne incrassato, calyce quinquesido, stigmatibus 6 brevibus erectis. *DC. Prod. 3. p. 429.*

M. aequilaterale; foliis subaequilateri-triquetris virescentibus, marginibus laevibus cartilagineis; caulibus debilibus prostratis. *Haw. Rev. p. 120.* — *Synop. p. 237.* — *Ait. Kew. ed. 2. vol. 3. p. 239.*

M. aequilaterale; foliis subconnatis acutis glabris arcuatis confertis aequilateri-triquetris, caule angulato repente. *Willd. Spec. pl. 2. p. 1051.* — *Enum. p. 538.*

M. aequilaterum; foliis confertis subconnatis longis obsolete-punctatis subaequilateri-triquetris integerrimis, caule angulato subradicante prostrato. *Haw. Mesemb. p. 390. No. 128.*

RADIX lignosa, fibrosa.

CAULES prostrati, (nisi suffulti,) pedales, vix crassitie pennae anserinae, flexiles, tortuosi, nodosi, ramosi, juniores ramique herbacei compressi, dein lignosi angulati, cortice ferrugineo.

FOLIA subconferta, basi connata, juniora erecta, seniora patentissima, arcuato-incurvula, aequilateri-triquetra, poll. 2-3 longa et vix lin. 3 basi lata, parum attenuata, apice obtusiuscula cum mucronulo saepe rubro, glaucescenti-laeteviridia, maculisque purpureis saepe notata, impunctata, basi intus complanato-gibbosa, ad angulos laevissima.

FLORES solitarii, terminales, magni, speciosi, meridie expansi, pedunculati. Pedunculus brevis, obsolete tetragonus, ancipite-compressus, superne dilatatus.

CALYX turbinatus, compressus, carnosus, quinquesfidus; lacinias duabus elongatis foliiformibus, tribus brevibus acutis, margine membranaceis.

PETALA bi vel triseritalia, erecto-recurvata, lanceolata, apice erosula, laete purpurea.


STAMINA numerosa, pistillum tegentia. Filamenta flavida. Antherae flavae.

PISTILLUM. Ovarium turbinatum, supra depresso. Styli 6 breves, subulati, erecti, flavidi.

CAPSULA 6 locularis; maturam non vidi.

Habitat in nova Hollandia. Floret aestate, at rarissime.

Observ. Cl. Jos. Banks anno 1791 hanc speciem e nova Hollandia advexit. Gracillima est in tota sectione, et foliis vix acinaciformibus. In varietate *decagyna* rami et folia paulo sunt robustiora, sed flores non frequentiores; nam longum per tempus in horto Dyckensi jam culta hucusque non floruit, et inde decernere non possum an flores sint *decagyni*. Capsulas quoque non vidi et in hortis rarissime ad maturitatem pervenient; pulposae sunt et ruberrimae secundum Cl. Haworth.





M. virgescens.

(§.49.—Fig. 3.)

MESEMBRYANTHEMUM VIRESSENS Haw.

MESEMBRYANTHEMUM virescens; caule angulato prostrato, foliis connatis subglaucescenti-viridibus subaequilateri-triquetris elongatis obtusis patent-i-incurvulis, ad angulos laevibus, flore pedunculato decagyno.

M. virescens; caulibus decumbenti-prostratis; foliis subaequilateri-triquetris subvirentibus, pedunculis terminalibus solitariis alato-ancipitibus, calyce 4-fido, stigmatibus 8 filiformibus. DC. Prod. 3. p. 429.

M. virescens; foliis subaequilateri - triquetris subvirescentibus; caulibus decumbenti-prostratis; pedunculis terminalibus solitariis alato-ancipitibus; stylis octo. Haw. Synop. p. 236. — Rev. p. 120.

RADIX lignosa, ramosa, fibrosa.

CAULES prostrati, (nisi suffulti,) bipedales, crassitie pennae anserinae, subrigidi, tortuosi, nodosi, ramosi, juniores ramique herbacei compressi, dein lignosi angulati, cortice cinereo-fusco.

FOLIA conferta, basi connata, juniora erecto-, seniora patent-i-incurvula, poll. 2 cum lin. 3 longa et lin. 4-5 basi lata, subaequilateri-triquetra, sed propter carinam parum productam fere subacinaciformia, apice subcartilaginea obtusa cum mucronulo, laeteviridia rore glauco laevi obducta, impunctata, quandoque purpureo maculata, basi intus complanato-gibbosa, ad angulos laevia.

FLORES solitarii, terminales, magni, speciosi, meridie expansi, pedunculati. Pedunculus brevis, alato-anceps, superne dilatatus.

CALYX turbinatus, valde compressus, subundulato-alatus, carnosus, quadri aut quinquefidus; lacinias duabus triquetris carinatis, duabus aut tribus brevioribus acutis, margine membranaceis.

PETALA biserialia, erecto-recurvata, lanceolata, apice erosula, laete purpurea.


STAMINA numerosa, pistillum tegentia. Filamenta flavida. Antherae flavae.

PISTILLUM. Ovarium turbinatum, supra depresso. Styli 12-14 breves, subulati, erecti, flavidi.

CAPSULA 12-14 locularis; maturam non vidi.

Habitat in nova Hollandia. Floret aestate satis frequenter.

Observ. Hanc speciem communicavit Dom. Kirby Cl. Haworthio anno circiter 1804. Differt praesertim a **M. Rossi** et **aequilaterali** caule folisque crassioribus et accedit ad maximas species hujus sectionis.





M. amaranthaceum.

(§. 25. — Fig. 2.)

MESEMBRYANTHEMUM AURANTIACUM Haw.

MESEMBRYANTHEMUM aurantiacum; caule fruticoso ramisque compressis fastigato-erectis, foliis subconnatis recurvato-patulis obtuse triquetris laevibus perglauca punctatis acutiusculis, flore mediocri aurantiaco.

M. aurantiacum; caule suffruticoso erecto, foliis obtuse triquetris subcompressis perglauca, bracteis semiteretibus, calycis lobis oblongo-ovatis, stigmatibus alterne purpureis.
DC. Prod. 3. p. 437.

M. aurantium; foliis praeglaucis triquetris subcompressis, bracteis semiteretibus; calycinis foliolis oblongo-ovatis; petalis saturate aurantiis imbricatis: stylis extus purpureis. *Haw. Miscel. nat. p. 84. — Synop. p. 264. — Revis. p. 148. — Ait. Kew. ed. 2. vol. 3. p. 243.*

M. aurantium; foliis obtuse triquetris pellucido-punctatis distinctis, caule erecto, ramis fastigiatis. *Willd. Enum. p. 537.*

M. glaucooides; foliis triquetris distinctis pellucido-punctatis, carinis obtusis subglabris, pedunculis bracteatis. *Haw. Mesemb. p. 330.*

RADIX sublignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS erectus, substrictus, fere bipedalis, lignosus, ramosus. **Rami** sparsi, fastigiati erecti, compressi, cortice primo ferrugineo, dein fusco.

FOLIA subconferta, basi vix connata, patula, recurvata, subaequilateri-triquetra angulis obtusis, lin. 10-13 longa, vix lin. 2 lata, viridia, rore perglauco obducta, pellucide punctata punctis sub prominulis, apice obtusiuscula cum mucronulo.

FLORES terminales, solitarii, diametro sesquipolllicari, speciosi, meridie expansi. **Pedunculus** sesquipolllicem longus, teres, superne incrassatus, nudus.

CALYX turbinatus, quinquefidus: laciniis subaequalibus, tribus margine membranaceis.

PETALA subtriserialia, expansa, late lanceolata, obtusiuscula, aurantiaca.


STAMINA erecta. **Filamenta** aurantiaca. **Antherae** flavae.

PISTILLUM. Ovarium turbinatum, supra convexum. **Styli** 5 erecto-patentes, abbreviati, acuti, subramentacei, externe purpurei, interne lutescentes, filamentis multo breviores.

CAPSULA 5-locularis, obconica.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret aestate.

Observ. Cl. Masson hanc speciem anno 1793 in Angliam advexit. A **M. glauco** differt ramis gracilioribus, foliis tenuioribus ac minus triqueto-compressis, flore que minore intense croceo. Pro hybridam progeniem **M. glauci** et **aurei**, ut putat cl. De Candolle, hanc plantam non habeo.





M. auratum.

(S. 25. — Fig. 5.)

MESEMBRYANTHEMUM AUREUM Lin.

MESEMBRYANTHEMUM aureum; caule fruticoso ramisque subcompressis erectis strictis; foliis subconnatis patulis farctim-triquetris laevissimis glaucescentibus pellucido-punctatis apice obtusiusculis cum mucrone, flore amplio aureo.

M. aureum; caule suffruticoso erecto, foliis cylindraceo-triquetris subconnatis patulis acutis pellucido-punctatis glaucis, stigmatibus atropurpureis. *DC. Prod. 3. p. 437.*

M. aureum; foliis cylindrico-triquetris punctatis distinctis, petalis croceis, stylis atropurpureis. *Haw. Miscel. nat. p. 84. — Synop. p. 263. — Rev. p. 148. — Ait. Kew. ed. 2. vol. 3. p. 243.*

M. aureum; foliis cylindrico-triquetris punctatis distinctis pistillis atropurpureis. *Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 1060. — Ait. Kew. ed. 1. vol. 2. p. 190. — Willd. Spec. pl. 2. p. 1019. — Haw. Mesembr. p. 333. — Bot. Mag. t. 262. — DC. Pl. bras. t. 11.*

RADIX lignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS erectus, strictus, bipedalis et ultra, ramosus; rami sparsi, erecti, compressi, cortice primo ferrugineo, dein brunneo.

FOLIA subremota, basi vix connata, patula, stricta aut recurvula, aequilatero-triquetra lateribus convexis, poll. 2 longa et lin. 3 lata, decidua, laeteviridia rore glauco obducta, pellucido-punctata, nitidula, apice obtuso cum mucrone.

FLORES terminales solitarii diametro bipollicari, speciosi, meridie expansi, longe pedunculati. **Pedunculus** poll. 2 cum dimidio longus, teres, superne incrassatus, nudus.

CALYX turbinatus quinquefidus; lacinias tribus latioribus margine membranaceis, duabus lanceolato-acutis.


PETALA multiserialia, expansa, anguste lanceolata, acuta, crocea. **Stamina** erecta, conferta. **Filamenta** crocea. **Antherae** flavae.


PISTILLUM. **Ovarium** turbinatum, supra convexum. **Styli** 5 patentibus, elongati; subulati, acuti, atropurpurei.

CAPSULA 5-locularis; obconica.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret aestate.

Observ. Haec planta teste cl. Aiton in horto Chelscano jam tempore Milleri culta erat, qui illam attamen non descriptsit. Ill. Linneus in editione decima Systematis naturalis anno 1759 hanc speciem instituit; sed ex eo tempore oblitterata esse videtur, quia nec acuratissimus Lamarck in *Encycl.* nec Gmelin in *edit. 13 Syst. nat.* illam commemorat. Cl. Aiton vero hanc speciem in horto *Kewensi* (*ed. 1. anno 1789*) restituit, et nunc vulgatissima est in hortis planta.





M. falciforme.

(§. 29. — Fig. 1.)

MESEMBRYANTHEMUM FALCIFORME Haw.

MESEMBRYANTHEMUM *falciforme*; caule suffruticoso ramoso, ramis divaricatis, foliis confertis triquetris arcte falcatis angulis aincipitibus, carinali producto, glaucis punctatis punctis validis sub prominulis pellucidis.

M. falciforme; caule suffruticoso demum decumbente, foliis confertissimis parvulis crassis falcatis acinaciformibus glaucis grandipunctatis, floribus subfastigiatis. *DC. Prod. 3. p. 433.*

M. falciforme; foliis confertissimis crassis acinaciformiter falcatis grandipunctatis glaucis. *Haw. Synops. p. 299. — Revis. p. 137.*

RADIX lignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS suberectus, flexuosus, lignosus, rigidus, valde ramosus. Rami divaricati, diffusi, angulati, apice carnosuli rosei, inferne cortice ochraceo dein cinereo.

FOLIA in ramulis confertissima, juniora subconnata crassa valde triquetro-compressa, incurvato-erecta, falcata, angulo carinali acinaciformiter dilatato, lin. 6-9 longa, et lin. 2 superne lata, inferne valde attenuata, apice in mucronem exserta, pallide viridia, rore glauco obducta, grandipunctata, et punctis prominulis ad lucem pellucidis rugulosa.

FLORES terminales, solitarii aut ternati, meridie expansi, fragrantes, pedunculati. Pedicelli tenues, superne incrassati, poll. 2-3 longi, bibracteati, bracteis parvulis foliiformibus.

CALYX turbinatus in pedunculum attenuatus, quinquefidus; laciniis subaequalibus tribus acutis, duabus margine membranaceis sub apice mucronatis.


PETALA numerosa, pluriserialia, expansa, anguste lanceolata, obtusa, rosea, laciniis calycinis triplo longiora.


STAMINA erecta. Filamenta brevia, albida. Antherae parvulae flavidae.

PISTILLUM. Ovarium obconicum, supra convexiusculum. Styli 5 crassiusculi, erecti, acuti, vix recurvuli, subramentacei, longitudine filamentorum.

CAPSULA 5-locularis, obconica.

Observ. Haec species, anno circiter 1805 in Angliam introducta, propter flores ternatim dispositos et saepe solitarios praecedenti sectioni **Pallidiflorum** adscribi potest; sed melius hic locatam censeo. Folia omnino falciformiter incurvata, et flores saturatius rosei eam **Falcatis** conjungunt.





M. lumn autumn.

(§. 29. — Fig. 3.)

MESEMBRYANTHEMUM LUNATUM Willd.

MESEMBRYANTHEMUM lunatum; caule suffruticoso ramoso, ramis suberectis flexuosis; foliis confertis subtriquetro-compressis arce falcatis, angulis rotundatis carinali producto, glaucissimis impunctatis laevissimis.

M. lunatum; caule lignoso erecto, ramis aggregatis, foliis parvis confertissimis impunctatis compresso-triquetris arctissime incurvo-lunulatis. *DC. Prod. 3. p. 433.*

M. lunatum; foliis parvis confertissimis subconnatis compresso-triquetris arctissime incurvo-lunulatis, caule erecto, ramis aggregatis. *Haw. Revis. p. 136.*

M. lunatum; foliis subconnatis acinaciformi-lunatis impunctatis confertis tenuissime papillosis. *Willd. Enum. p. 538.*

RADIX lignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS erectus, flexuosus, lignosus, rigidus, ramosus. Rami suberecti flexuosi, teretes, apice carnosuli rosei, inferne cicatrisci cortice ochraceo, dein cinereo-fusco.

FOLIA in ramulis confertissima, juniora subconnata, crassa, vix triquetro-compressa, incurvato-erecta, falcata seu lunata, angulis rotundatis carinali producto dilatato, lin. 5-6 longa et lin. 2 superne lata, basi cylindraceo-attenuata, apice obtusa cum mucronulo saepe purpurascente, pallide viridia rore glaucissimo obducta, minutissime papillosa, impunctata, laevia.

FLORES terminales, ternati aut bigeminati, meridie expansi, fragrantes, pedunculati. Pedicelli partiales bibracteati, bracteis parvulis lunulatis, in pedunculum communem apice bracteatum incidentes, tenuissimi, superne subincrassati, pollicem longi.

CALYX turbinatus, quinquefidus, laciniis subaequalibus, tribus carinatis acutis, duabus margine membranaceis sub apice mucronatis.

PETALA numerosa, subuniserialia, recurvato-expansa, lanceolata, acutiuscula, pallide rosea, laciniis calycinis duplo longiora.


STAMINA collecta, filamentis sterilibus roseo-albis circumdata. Filamenta albida. Antherae flavae.

PISTILLUM. Ovarium turbinatum supra convexum. Styli 5 subulati, erecto-recurvuli, lutescentes, longitudine filamentorum.

CAPSULA 5-locularis, obconica.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret aestate.

Observ. Haec species in horto botanico Berolinensi e semine capensi orta, a cl. Willdenow anno 1809 primo descripta est. A *M. falcato* differt caule robustiore foliisque multo majoribus, et a *M. falciformi* foliis minoribus, rotundato-triquetris, superne subclavato-incrassatis.





M. forficatum.

(§. 31. — Fig. 1.)

MESEMBRYANTHEMUM FORFICATUM Lin.

MESEMBRYANTHEMUM *forficatum*; caule suffruticoso ramisque decumbentibus ancipitibus, foliis connatis subdecurrentibus erectis valde triquetro-compressis impunctatis viridibus apice rotundatis aculeato-denticulatis.

M. forficatum; caulis suffrutescentibus decumbentibus, foliis oppositis triquetro-compressis viridibus apice spinuloso-mucronatis, pedunculo angulato, petalis uniseriatis, stigmatibus 5 brevissimis. DC. Prodr. 3. p. 430.

M. filamentosum. β. anceps. DC. Pl. grass. p. 60.

M. forficatum; foliis triquetro-compressis viridibus, apice spinulosis, caule ancipiti decumbente. Haw. Synop. p. 280. — Rev. p. 123. — Miscel. nat. p. 78. — Mesemb. p. 394. — Ait. Kew. ed. 2. vol. 3. p. 240.

M. forficatum; foliis acinaciformibus obtusis impunctatis connatis apice spinosis, caule ancipiti. Lin. Spec. pl. 695. — Ait. Kew. ed. 1. vol. 2. p. 189. — Lam. Encycl. No. 34. β. (excl. Syn. Jacq. Hort. Vind.) — Willd. Spec. pl. 2. p. 1051.

RADIX lignosa, ramosa, fibrosa.

CAULES decumbentes (nisi suffulti) subpedales, rigidi, flexuosi, parum ramosi, juniores ramique carnosí, compressi, dein lignosi, alati, cortice aurantio-ferrugineo.

FOLIA remotiuscula, valde connata, angulo carinali decurrentia, forficatim-opposita, erecta, apice rotundato-obtusa, pollicem et ultra longa, maxime inaequilateri-triquetra, superficie supera vix lin. 2, laterali vero lin. 4-5 lata, laevia, impunctata, nitidula, viridia, laevissime glaucescentia, angulo carinali ancipiti, inferne integerrimo superne denticulato, dentibus minutissimis, acutis, aculeiformibus.

FLORES solitarii, speciosi, meridie expansi, pedunculati. **Pedunculus terminalis**, sesquipollucaris, teretiusculus.

CALYX subglobosus quinquesfidus; laciinis subaequalibus, ovato-lanceolatis, obtusiusculis.

PETALA subuniserialia, expansa, lanceolato-acuta, rosea, basin versus linea media saturatiore notata.

STAMINA collecta, filamentis sterilibus albido apice roseis circumdata, pistillum tegentia. **Filamenta albida.** Antherae flavidæ.

PISTILLUM. Ovarium subglobosum. **Styli 5 breves**, triquetri, acuti, erecti, hispiduli, atropurpurei.

CAPSULA 5-locularis; maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret a mense Augusto ad Octobrem.

Observ. Haec species, jam anno 1750 a cl. Miller culta et ab ill. Linneo optime descripta, a posteris botanicis, et praesertim a cl. Jacquin, cum *M. mutabili* confusa est. Distinctissima est species nullae aliae vere affinis; raro floret, et in hortis non frequenter occurrit.



M. semidentatum,

(§. 33. — Fig. 5.)

MESEMBRYANTHEMUM SEMIDENTATUM Nob.

MESEMBRYANTHEMUM semidentatum; caule fruticoso ramisque simplicibus erectis strictis, foliis vaginato-connatis erecto-patentibus aequilateri-triquetris elongatis, albidis, punctatis, angulo carinali superne subquadridentato.

M. semidentatum; caule fruticoso, ramis simplicibus strictis, foliis connato-vaginatis triquetris compressis albidis punctatis, carina **1-4** dentata. *DC. Prod. 3. p. 430.*

M. semidentatum; ramis simplicibus gracilibus strictis duris, foliis triquetris punctatis albidis, dorso superne **1-4** dentatis. *Haw. Revis. p. 125.*

M. semidentatum; ramis simplicibus strictis, foliis triquetris compressis punctatis vaginatis, angulo carinali a medio ad apicem subquadridentatis; floribus terminalibus solitariis rubicundis. *Nob. Observ. bot. 1820. p. 9.*

M. semidentatum; ramis simplicibus duris, foliis triquetris dorso superne unidentatis punctatis asperisque. *Haw. Suppl. p. 95.*

RADIX lignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS lignosus, erectus, strictus, fere tripedalis, parum ramosus, rami fastigato-erecti, simplices, compressi, rigidi, primo carnosi lutescentes, dein lignosi cortice cinereo-fusco.

FOLIA valde remota, basi vaginato-connata, vaginis compressis decurrentibus, internodia usque ad medium tegentibus, utrinque lineola exaratis, superne erecto-patula aequilateri-triquetra, apice obtusiuscula cum mucronulo rubro, lin. **13-16** longa et lin. **2** ad vaginas lata lateribus convexiusculis, albicantia nec rore glauco obducta, punctata, punctis sub prominulis saturati oribus, ad lucem pellucidis, angulo carinali inferne integerrimo apicem versus subdilatata, et aculeis **2-4** validis distantibus respicientibus saepe purpurascens instructa.

FLORES terminales, solitarii, pedunculati, meridie expansi. **Pedunculus brevis, lin. 6-7 longus, compressus, superne dilatatus.**

CALYX subturbinatus, quinquefidus; laciniis subaequalibus latiusculis, duabus margine membranaceis.

PETALA subuniserialia, anguste lanceolata, acuta, divaricatim expansa, laete rubicunda.


STAMINA collecta, filamentis sterilibus albidis apice roseis, aut omnino rubicundis circumdata. **Filamenta albida. Antherae luteae.**

PISTILLUM. Ovarium turbinatum, supra planiusculum. **Styli 5 basi crassissimuli, subulati, erecti, flavigredi, filamentorum longitudine.**

CAPSULA 5 - locularis; maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret a mense Julio ad Septembrem.

Observ. Hanc plantam anno 1814 Vindobonae in hortulo caesareo, ubi e semine capensi enata, inveni, et eam primo pro dubioso *M. perfoliato*, *foliis majoribus triacanthis Dillenii Elth. f. 240* habui. Magna revera est affinitas harum plantarum; sed nostra foliis duplo triplove longioribus, aequilateralibus et multo minus confertis, diversa est. A sectione *Uncinotorum* non recedit; attamen cum *M. unidentato*, *lineato*, et quoque *perfoliato triacantho Dill.* subdivisionem *foliis compressis elongatis*, constituere debet. Cl. Haworthio hanc speciem sub nomine *M. semidentati* misi, qui illam imperfecte in Supplemento plantarum succulentarum anno 1819 descriptis.





M. Haworthii.

(§.40. — Fig.1.)

(§. 40. Fig. 1.)

MESEMBRYANTHEMUM HAWORTHII Donn.

MESEMBRYANTHEMUM Haworthii; caule fruticoso ramisque erectis, foliis subconfertis subdistinctis incrassatis semicylindraceis apice subcompressis utrinque attenuatis patenti-incurvulis perglaucis laevibus; flore ampio purpureo.

M. Haworthii; caule fruticoso erecto, foliis confertis subcompresso-cylindraceis utrinque attenuatis, junioribus erectis, senioribus patentibus glaucis. DC. Prod. 3. p. 439.

M. Haworthii; foliis semiteretibus acutiusculis punctatis connatis, pedunculo incrassato, petalis emarginatis. Willd. Enum. Suppl. p. 35.

M. Haworthii; foliis subulatis tereti-triquetris acutis subincurvatis valde glaucis; cortice rufo castaneo-ove. Haw. Revis. p. 154. — Synops. p. 302. — Miscel. nat. p. 65. — Ait. Kew. ed. 2. vol. 3. p. 233. — Donn Hort. Cantab. p. 66.

RADIX sublignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS erectus, substrictus, bipedalis, lignosus, rigidus, ramosus; rami decussatim oppositi, suberecti, teretes, apice carnosuli viriduli, inferne nudi cicatriscati, cortice primo ferrugineo, dein rufo.

FOLIA in apice ramorum subconferta, juniora connata, seniora subdistincta, patentia, subincurvata, carnosa, pollicem aut sesquipollicem longa, et lin. 2-3 medio lata, utrinque attenuata, basi semicylindracea, superne compresso-teretia, apice obtusiuscula cum mucrone saepe purpurascente, laete viridia rore glauco obducta, obsolete pellucido-punctata, laevia.

FLORES terminales, solitarii, diametro fere tripollicari, speciosi, meridie expansi, pedunculati. Pedunculus sesquipollicem longus, teres, superne incrassatus et medio bracteis duabus foliiformibus instructus.

CALYX turbinatus quinquefidus; laciinis subaequalibus duabus acutis, tribus margine membranaceis sub apice mucronatis.

PETALA subtriserialia, expansa, lato-lanceolata, acutiuscula, integra, purpurea, laciinis calycinis triplo longiora.


STAMINA collecta, filamentis sterilibus albidis et purpureis circumdata. Filamenta roseo-albida, basi barbata. Antherae flavae.


PISTILLUM Ovarium obconicum, supra planiusculum. Styli 5 brevissimi, globulosi, flavi.

CAPSULA 5-locularis; maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret aestate.

Observ. Haec species, quam cl. Haworth anno 1793 in Angliam introduxit, et cui cl. Donn Haworthii nomen imposuit, pulcherrimis in genere adnumeranda est. Folia juniora subconnata sunt et seniora subdistincta; unde cl. Willdenow ea dixit connata et cl. Haworth distincta.





M. coralliflorum.

(§.40. — Fig. 2.)

MESEMBRYANTHEMUM CORALLIFLORUM Nob.

MESEMBRYANTHEMUM coralliflorum; caule fruticoso ramisque erectis, foliis remotis subconnatis clavato-elongatis teretiusculis patentibus aut recurvatis glaucis laevibus, flore longissime pedunculato.

M. corallinum; caule stricto ramosissimo, foliis teretiusculis incurvantibus laevibus medio subcrassioribus glaucis. *DC. Prod. 3. p. 440.*

M. corallinum; foliis teretiusculis incurvantibus, laevibus medio subcrassioribus glaucis: caule stricto ramosissimo, cortice pullo spadiceove. *Haw. Revis. p. 154. (exclus. Synonym. Thunbergii.)*

RADIX lignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS erectus, strictus, tripedalis, lignosus, rigidus, valde ramosus. Rami dense decussatim oppositi, erecti, laevissime compressi, apice carnosuli viriduli, inferne cortice primo livide ferrugineo vel spadiceo, dein cinereo-rubo.

FOLIA in ramulis incipientibus conserta, sed in ramis enatis remota, juniora erecto-incurvata connata, seniora patentia, in aut recurvantia, subconnata, poll. 2 longa et sesquilineam superne lata, inferne attenuata, teretiuscula, apice obtusa cum mucronulo brevissimo saepe purpurascente, viridia rore glauco obducta, parce pellucido-punctata, laevia.

FLORES terminales, solitarii, diametro bipollicari, speciosi, ante meridiem expansi, longe pedunculati. Pedunculus fere poll. 6 longus, teres, medio bracteis duabus semiteretibus breviusculis apice incurvato-mucronatis instructus.

CALYX subturbinatus, quinque raro quadrifidus; laciniis subaequalibus, duabus acutis, tribus margine membranaceis sub apice mucronatis.

PETALA uniserialia, subincurvato-expansa, lato-lanceolata, acutiuscula, integra, laete purpurea, laciniis calycinis duplo longiora.


STAMINA collecta, filamentis sterilibus pallide roseis circumdata. Filamenta roseo-albida. Antherae flavidae.

PISTILLUM Ovarium obconicum supra convexiusculum. Styli 5 raro 4, erecti, brevissimi, acuti, subramentacei, flavidi.

CAPSULA 5 aut 4-locularis; maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret aestate.

Observ. Haec planta, anno 1819 in horto Kewensi e semine capensi enata, intermedia est inter **M. Haworthii** et **M. stipulaceum**; a primo differt caule graciliore et ramosiore, foliis tenuioribus subclavatis nec apice attenuatis, flore longissime pedunculato minore, petalisque uniserialibus. Nomen mutandum est, quia jam a cl. Thunberg aliae speciei tributum, quae caule spithameo, ramulis articulatis, floreque sessili niveo, omnino a planta nostra recedit.





M. stipulaceum.

(S. 40. — Fig. 3.)

MESEMBRYANTHEMUM STIPULACEUM Lin.

MESEMBRYANTHEMUM *stipulaceum*; caule fruticoso ramisque erectis, foliis confertis subdistinctis linearis-elongatis semiteretibus patent-recurvulis perglauca laevibus, axillis valde proliferis.

M. stipulaceum; caule fruticoso ramisque erectis, foliis tereti-triquetris longis subulatis incurvantibus glaucis pellucido-punctatis basi marginatis. *DC. Prod.* 3. p. 439.

M. stipulaceum; foliis longis tereti-triquetris subulatis incurvantibus glaucis, basi marginatis. *Haw. Revis.* p. 154.

M. stipulaceum; foliis subconfertis tereti-triquetris subulatis incurvis glaucis basi marginatis. *Haw. Synops.* p. 301. — *Miscel. nat.* p. 65. — *Ait. Kew. ed. 2. Vol. 3.* p. 233.

M. stipulaceum; foliis subtriquetris compressis incurvis punctatis distinctis congestis: basi marginatis. *Lin. Spec. pl.* p. 693. — *Hort. Cliff.* p. 220. — *Roy. Lugd. bat.* p. 287. — *Mill. Dict.* No. 23. — *Lam. Encycl.* No. 27. — *Willd. Spec. pl.* 2. p. 1040.

M. frutescens, flore purpureo rariore. *Dill. Elth.* p. 279. t. 209. Fig. 267, 268.

RADIX lignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS erectus, strictus, sesquipedalis, lignosus, valde ramosus. Rami dense decussatim oppositi, suberecti, teretes, apice carnosuli viriduli, inferne nudi cortice primo ferrugineo, dein cinereo-fusco.

FOLIA in apice ramorum conferta, patentia, juniora connata incurvula, seniora subdistincta arcuato-recurvula poll. 2 fere longa et lin. 1-2 lata, linearia, basi semicylindracea, superne obtuse triquetra, apice obtusiuscula cum mucronulo, laete viridia rore glauco obducta, ad lucem pellucido-punctata, laevia.

FLORES terminales, solitarii, diametro fere sesquipolllicari, meridie expansi, pendulati. Pedunculus fere sesquipollicem longus, teres, medio bracteis duabus foliiformibus instructus.

CALYX subturbinatus, quinquesfidus; laciniis subaequalibus, duabus acutis, tribus margine membranaceis sub apice mucronatis.

PETALA subtriserialia, recurvato-expansa, anguste-lanceolata, acuta, integra, purpurea, laciniis calycinis duplo longiora.


STAMINA erecta, brevia. Filamenta rosea. Antherae pallide flavidæ.

PISTILLUM. Ovarium obconicum supra convexum. Styli 5 obclavati, acuti, erecti, lutescentes, longitudine filamentorum.

CAPSULA 5-locularis; matutram non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret a mense Majo ad Julium, at rarissime.

Observ. Haec antiqua planta a Joh. Sherard anno 1723 jam culta et a Dillenio bene descripta, ex eo tempore dubiosa evasit. Rarissime floret, et folia nullo modo basi marginata sunt. Stipulae quoque non adsunt, quare nomen huic speciei tributum omnino est improprium. In axillis foliorum vetustiorum saepe inveniuntur ramulorum primordia, quae stipulas simulant. A *M. corallifloro* differt caule humiliore, foliis confertioribus semitereti-triquetris nec apice subclavato-incrassatis, flore minore staminibusque effusis.





M. spiniforme

(S. 47. — Fig. 1.)

(§. 47. Fig. 1.)

MESEMBRYANTHEMUM SPINIFORME Haw.

MESEMBRYANTHEMUM spiniforme; caule suffruticoso subramoso ramulis erectis substrictis, foliis remotiusculis subconnatis cylindraceo - subulatis incurvato - erectis imo apice vix recurvulis, floribus pedunculatis, pedunculo bracteato; stylis purpureis.

M. spiniforme; caule suffruticoso, ramis erectis, foliis cylindraceis subulatis spiniformibus erectis apicibus subrecurvis, pedunculis carinisque bractearum scabriusculis. DC. Prod. 3. p. 439.

M. spiniforme; ramulis foliisque cylindricis subulatis spiniformibus erectis, apicibus subrecurvis pedunculis carinisque bractearum scabriusculis. Haw. Miscel. nat. p. 87. — Synop. p. 291. — Revis. p. 152. — Ait. Kew. ed. 2. vol. 3. p. 215.

RADIX lignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS pedalis, lignosus, rigidus, parum ramosus; ramuli substricti, tereles, erecti, laevigati, cortice cinereo-fusco.

FOLIA subconnata, subremota, longitudine valde inaequalia, bipollucaria aut semi-pollucaria, et lin. 1-2 basi lata, sere cylindracea, subulata, acuminata, viridia, laevissima, nitidula, obsolete pellucido-punctata, basi patento-incurvata, erecta, stricta, imo apice vix recurvula.

FLORES terminales, solitarii, parvuli, ante meridiem expansi, pedunculati. Pedunculus pollucem longus, teres, medio bracteis duabus connatis acutis instructus.

CALYX parvulus, obconicus, quinquefidus; laciniis subaequalibus, tribus margine membranaceis.

PETALA uniserialia, radiatim expansa, obtusiuscula, pallide rubicunda, basi albida.


STAMINA collecta, filamentis sterilibus pallide rubicundis circumdata, pistillum tegentia. Filamenta rosea; Antherae flavidae.

PISTILLUM. Ovarium obconicum supra planiusculum. Styli 5 erecti, subulati, purpurei, filamentis breviores.

CAPSULA obconica, 5-locularis; maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret mensibus Martio et Aprili.

Observ. Cl. Masson hanc speciem anno 1793 in Angliam advexit, quae a congeneribus caule erectiore foliisque longioribus, strictis, remotis, vix apice recurvulis, facile distinguitur. Varietas subadunca a cl. Haworth in *Synopsi* et in *Revisionibus M. spiniformi* tributa non constans se praebet, et notatu non digna est.





M. curvifolium.

(§. 47. — Fig. 2.)

MESEMBRYANTHEMUM CURVIFOLIUM Haw.

MESEMBRYANTHEMUM *curvifolium*; caule suffruticoso ramoso, ramulis divaricatis confertis flexuosis, foliis capitatum collectis connatis cylindraceo-subulatis basi patentio-incurvatis apice recurvulis; floribus breve pedunculatis, calyce clavato basi bracteato; stylis purpureis.

α. *majus*; floribus rubicundis.

M. curvifolium; caule suffruticoso, ramulis firmis suberectis asperiusculis angulato-compressis, foliis subdistantibus basi expausis tunc incurvo-recurvis. DC. Prod. 3. p. 439.

M. curvifolium; foliis subdistantibus, basi expansis, tunc incurvo-recurvis compresso-semiteretibus subulatis, ramulis firmis suberectis asperiusculis angulato-compressis. Haw. Revis. p. 152.

M. curvifolium; foliis basi expausis, tunc incurvo-recurvis compresso-semiteretibus subulatis, ramulis decumbentibus asperiusculis angulato-compressis. Haw. Miscel. nat. p. 88. — Synop. p. 290. — Ait. Kew. ed. 2. vol. 3. p. 245.

M. ceratophyllum; foliis teretibus apice subtriquetris connatis arcuatis nitidis, calycinis laciinis subaequalibus, caule erecto. Willd. Enum. Suppl. p. 36.

β. *minus*; floribus pallide roseis.

M. flexifolium; caule suffruticoso, ramulis filiformibus compressis flexuosis decumbentibus confertis, foliis triquetro-subulatis inferne incurvis superne recurvo-subflexuosis apice aduncis. DC. Prod. 3. p. 439.

M. flexifolium; foliis triquetro-subulatis inferne incurvis, superne recurvo-subflexuosis, apice subaduncis: ramulis subfiliformibus compressis flexuosis decumbentibus confertis. Haw. Revis. p. 153.

M. flexifolium; ramis effusis flexuosis, subfiliformibus compressis, foliis singulis triquetro-subulatis inferne incurvulis, superne subrecurvo-subflexuosis viridibus, apice parum aduncis. Haw. Suppl. p. 96.

M. aduncum; foliis teretibus connatis arcuatis acutis confertis, petalis calyce parum majoribus, caule diffuso. Willd. Enum. p. 534. — Styli 5 atropurpurei.

RADIX lignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS spithameus, lignosus, rigidus di aut trichotome diffusus; ramuli teretes, juniores suberecti, seniores subtortuoso-deflexi foliorum rudimentis desiccatis instructi, cortice cinereo-fusco.

FOLIA connata in apice ramorum conferta, in var. α. lin. 15 longa et vix lin. 2 basi lata, in var. β. paulo breviora ac graciliora, semicylindraceo-subulata, acuminata, subflexuosa et crassitudine varie inaequali quasi nodulosa, viridia, laevia, nitidula, obsolete pellucido-parvipunctata, basi patentia, medio arcuato-incurva, apice in- aut recurvula.

FLORES terminales, solitarii, egregii, ante meridiem expansi, pedunculati. **Pedunculus** lin. 4-5 longus, teres, superne bracteis duabus connatis acutis instructus.

CALYX crassiusculus, clavatus, lin. 6-7 longus, quinquefidus; lacinias duabus acutis, tribus latioribus margine membranaceis.

PETALA uniserialia, radiatim expansa, subspathulata, obtusiuscula, in var. α . rubicunda basi pallidiora, in var. β . alba medio tinctura rosea notata.

STAMINA collecta, filamentis sterilibus albidis apice rubicundis circumdata, pistillum tegentia. Filamenta et Antherae flavidae.

PISTILLUM. Ovarium clavatum supra convexiusculum. Styli 5 erecti subulati atropurpurei, in var. α . intus flavi, filamentis breviores.

CAPSULA obconica, 5-locularis; maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret autumno et quandoque primo vere.

Observ. Cl. Haworth, qui *M. curvifolium* anno 1799 in Angliam introduxit, benevoli hanc speciem, sicut etiam cl. Willdenow *M. ceratophyllum* suum mihi communicavit, et igitur nullum de synonymia duorum nominum superest dubium. Intermedia est haec species inter *M. spiniforme* et *aduncum*, et ab ambabus valde differt; sed *M. flexifolium* ab illa nullo discrimine specifico, ut e descriptione satis patet, separari potest. Hanc ultimam speciem ergo delevi et delenda sunt quoque varietates *minores* et *laetevirentes*, quas Cl. Haworth *M. curvifolio* et *M. flexifolio* adscripsit.



M. aduncum.

(§. 47. — Fig. 3.)

MESEMBRYANTHEMUM ADUNCUM Haw.

MESEMBRYANTHEMUM aduncum; caule suffruticoso ramoso, ramulis gracilibus suberectis confertis flexuosis, foliis capitatim collectis connatis cylindraceo-subulatis basi patento-incurvulis superne valde recurvatis; floribus pedunculatis, pedunculo bracteato; stylis flavidis.

M. aduncum; caule fruticoso, ramulis erectis confertissimis, foliis confertis semicylindricis acuminatis apice valde recurvis. DC. Prod. 3. p. 439.

M. aduncum; foliis confertis semicylindricis acuminatis apice valde recurvis, ramulis erectis confertissimis. Haw. Miscel. nat. p. 87. — Synop. p. 291. — Revis. p. 153. — Ait. Kew. ed. 2. vol. 3. p. 245.

RADIX lignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS vix spithameus, lignosus, rigidiusculus, diffusus. **Ramuli** flexuosi, gracieles, teretes, suberecti, foliorum rudimentis desiccatis instructi, cortice cinereo.

FOLIA connata, in apice ramulorum conferta, lin. 8 longa, et vix lineam basi lata, semicylindraceo-subulata, acuminata, subflexuosa, laete viridia, laevia, nitidula, obsolete pellucido-parvipunctata, basi patento-incurvata, superne valde recurvata.

FLORES terminales, solitarii, parvuli, ante meridiem expansi, pedunculati. Pedunculus lin. 9-10 longus, teres, medio bracteis duabus connatis, acutis, instructus.

CALYX parvulus, obconicus, quinquefidus; laciniis subaequalibus, tribus margine membranaceis.

PETALA uniserialia, radiatim expansa, spatulato-lanceolata, rubicunda, basi pallidiora.

STAMINA collecta, filamentis sterilibus albis apice rubicundis circumdata, pistillum tegentia. Filamenta albida. Antherae flavae.

PISTILLUM. Ovarium obconicum supra planiusculum. Styli 5 erecti, subulati, glabrescentes, longitudine filamentorum.

CAPSULA obconica, 5-locularis; maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret mensibus Martio-Aprili.

Observ. Haec species anno 1795 a cl. Masson in Augliam advecta fuit. A *M. curvifolio*, adque adeo a varietate minore, differt caule duplo graciliore minusque flexuoso; folia quoque minora sunt et magis recurvata, sicuti flores minus conspicui.



M. filicaule.

(§. 47. — Fig. 4.)

MESEMBRYANTHEMUM FILICAULE Haw.

MESEMBRYANTHEMUM filicaule; caule ramisque filiformibus prostratis reptantibus; foliis capitatum collectis connatis cylindraceo-subulatis basi patento-incurvulis apice recurvatis; floribus longissime pedunculatis, pedunculo inferne bracteato; stylis flavidis.

M. filicaule; caulis caespitosus suffruticosus filiformibus debilissimis reptantibus, foliis confertissimis semicylindraceis acuminatis. DC. Prod. 3. p. 439.

M. filicaule; caespitosum: foliis confertissimis semicylindraceis acuminatis, caulis filiformibus debilissimis reptantibus. Haw. Miscel. nat. p. 88. — Synop. p. 291. — Revis. p. 153. — Ait. Kew. ed. 2. vol. 3. p. 244.

RADIX lignosa, ramosa, fibrosa.

CAULES ramulique lignosi, caespitose diffusi, gracillimi, prostrati, ad nodulos radicantes, foliorum rudimentis desiccatis instructi, cortice fusco.

FOLIA connata, in apice ramulorum collecta, lin. 16-18 longa et sesquilineam basi lata, semicylindraceo-subulata, acuminata, subflexuosa, et crassitudine varie inaequali quasi nodulosa, viridia, laevia, nitidula, obsolete pellucido-punctata, basi patento-incurvata, superne recurvata.

FLORES terminales, solitarii, egregii, ante meridiem expansi, pedunculati. Pedunculus poll. 2 longus, teres, inferne bracteis duabus connatis, acutis, instructus.

CALYX parvulus, obconicus, quinquefidus; lacinias subaequalibus, tribus margine membranaceis.

PETALA uniserialia, radiatim expansa, recurvula, spathulato-lanceolata, laete rubicunda basi pellucida.

STAMINA collecta, filamentis sterilibus albis apice laete rubicundis circumdata, pistillum tegentia. Filamenta albida; Antherae flavae.

PISTILLUM. Ovarium obconicum, supra planiusculum. Styli 5 erecti, subulati, flavescentes, longitudine filamentorum.

CAPSULA obconica, 5-locularis; maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret mensibus Martio - Aprili.

Observ. Cl. Haworth hanc speciem anno 1800 in Angliam introduxit, quae caule ramisque filiformibus prostratis extra ollam pendulis a congeneribus omnino recedit. Raro floret; sed elegantissime, floribus numerosis laetissime rubicundis, et pedunculis biplicaribus erectis suffultis.



M. expansum.

(§. 62. — Fig. 2.)

MESEMBRYANTHEMUM EXPANSUM Lm.

MESEMBRYANTHEMUM *expansum*; caule carnoso diffuso ramisque laxis reflexis, foliis connatis recurvato-patentissimis lato-lanceolatis acutis submicantibus planis nervo medio subtus carinatim producto; floribus bigeminatis, laciniis calycinis tribus latissimis duabus subulatis.

M. expansum; caule divaricato laxe expanso, foliis distinctis remotis oppositis alternisque planiusculis ovato-lanceolatis impunctatis. DC. Prod. 3. p. 449.

M. tortuosum. DC. Pl. grass. t. 94.

M. expansum; foliis ovato-lanceolatis confertis oppositis alternisque remotis. Haw. Miscel. nat. p. 50. — Synop. p. 249. — Ait. Kew. ed. 2. vol. 3. p. 227.

M. expansum; foliis ovato-lanceolatis distinctis oppositis alternisve remotis, caule divaricato laxo procumbente. Willd. Spec. pl. 2. p. 1035.

M. expansum; foliis planiusculis lanceolatis oppositis patentibus, ramulis floriferis prostratis. Lam. Encycl. No. 9.

M. expansum; foliis planiusculis lanceolatis impunctatis patentibus distinctis oppositis alternisque remotis. Lin. Spec. pl. p. 697. — Mill. Dict. No. 36. — Knorr. Delin. 2. t. M. 3. — Ait. Kew. ed. 1. vol. 2. p. 181. — Haw. Mesembr. p. 195. — Revis. p. 168.

M. tortuosum; foliis sempervivi expansis. Dill. Elth. t. 182. — fig. 223. — Bradl. Succ. 3. p. 7, t. 25. — Pluk. Amalt. p. 90. Ficoides 2.

RADIX carnosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS incrassatus, diffusus, ramique subpedales, decumbentes (nisi suffulti), flexiles, subtortuosi, grossi, carnosi, teretes, inferne nudi cortice cinereo, superne papuloso-nitentes foliosi.

FOLIA recurvato-expansa, fere sesquipollicem longa et lin. 8 medio lata, utrinque attenuata, apice acuta, supra planiuscula aut subconcava, subtus nervo medio prominulo carinata, integerrima, subvaginato-connata, in ramis sterilibus conferta, in floriferis remota et superne quandoque alterna; juniora crassiuscula, laete viridia, papillis minutissimis micantia, seniora marcescentia, et mortua membranacea, nervis venisque desiccatis persistentes.

FLORES terminales, magni, in pedunculo communi elongato incrassato papuloso, rite bigeminati cum intermedio tertio, uno alterove saepe abortivo, ante meridiem expansi. Pedicelli lin. 4-6 longi, crassiusculi, papulosi, basi et superne bracteati, bracteis ovato-acutis.

CALYX pyriformis, crassus, bullatus, papulosus, quinquesfidus; laciniis tribus planis foliiformibus, duabus oppositis subulato-acuminatis, recurvatis, basi membranaceis.

PETALA pluriserialia, angustissima, interiora breviora spurco-flavescens, exteriora pallidiora longitudine calycis laciniarum.

STAMINA conferta, pistillum tegentia. Filamenta albida. Antherae luteae.

PISTILLUM. Ovarium turbinatum, supra convexum. Styli 5 breves, clavati, recurvuli, subramentacei.

CAPSULA 5-locularis; maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret aestate.

Observ. Haec species sicut et *M. tortuosum* et *varians* antiquae sunt plantae jam anno 1705 a Plukenetio et Petiverio cognitae ac descriptae. Dillenius duas primas iconibus illustravit et Petiverius ultimam; sed saepe ex eo tempore permutatae sunt. *M. expansum* proxime accedit ad *M. varians*, et a *M. anatomico* differt caule multo minus ramoso, ramisque crassioribus, foliis expansis basi minus attenuatis, floribusque flavicantibus nec albidissimis.



M. relaxatum.

(§. 65. — Fig. 1.)

MESEMBRYANTHEMUM RELAXATUM Willd.

MESEMBRYANTHEMUM relaxatum; caule diffuso ramisque adscendentibus flexuosis, foliis semiamplexicaulibus distinctis linear-lanceolatis obtusiusculis erecto-patentibus glaucescenti-lividis supra subcanaliculatis subtus obtuse carinatis, floribus rubicundis.

M. relaxatum; caulibus decumbentibus teretibus flexuosis, foliis linear-lanceolatis obtusis glauco-lividis canaliculatis subpunctato-papulosis costa carinatis, calycis lobis 5 foliaceis, uno minimo. DC. Prod. 3. p. 449.

M. relaxatum; foliis lorato-oblongis obtusis glauco-lividis canaliculatis, subpunctato-papulosis, costatim carinatis, caulibus ramosis teretibus decumbentibus. Haw. Revis. p. 169.

M. relaxatum; foliis linear-lanceolatis subconnatis distinctis, junioribus semiteretibus, calycis foliolis duobus latioribus. Willd. Enum. Suppl. p. 36.

RADIX sublignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS incrassatus, diffusus, decumbens, rami flexuosi, pedales, adscendentes, tereles, inferne sublignosi, rigidi, cortice suberoso, cinereo, superne herbacei, laevissimi, epapulosi, foliosi.

FOLIA erecto-patentia, recurvula, in ramis sterilibus conferta, in floriferis remota, juniora semicylindracea, seniora fere poll. 2 longa et lin. 3-4 lata, superne et inferne parum attenuata, basi semiamplexicaulia subdistincta, apice obtusiuscula, integerrima, supra subcanaliculatim-excavata, subtus carinulata, livide viridia rore glauco obducta, laevissime papulosa, opaca.

FLORES in pedunculo communi epapuloso terminales, ternati aut (pedicellis lateribus longioribus quandoque bifloris) quini, sed abortu saepe solitarii, ante meridiem expansi. Pedicelli basi bracteati, bracteis foliiformibus parvulis.

CALYX turbinatus, epapulosus, quinquefidus; lacinii duabus paulo longioribus et latioribus, ante anthesin erectis oppositis, duabus margine membranaceis sub apice mucronatis, cum tertio intermedio.

PETALA biserialia, linear-oblonga, apice obtusa, erosula, laetissime purpurea, basin versus albida, lacinii calycinis duplo longiora.

STAMINA conferta, erecta. Filamenta albida. Antherae flavidae.


PISTILLUM Ovarium turbinatum, supra convexiusculum. Styli 5 subulati, erecto-recurvuli, staminum longitudine.

CAPSULA 5-locularis; maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret a mense Julio ad Octobrem.

Observ. Haec planta, tempore cl. Willdenow in horto Berolinensi culta, ibi verisimiliter ex semine capensi orta est. A sectione *Expansorum* recedit caulibus foliisque pruinosis, fere epapulosis et inflorescentia diversa. Folia latitudine et forma valde sunt variabilia secundum aetatem plantae et vegetationem.





M. pallens.

(§. 65. — Fig. 2.)

(§. 63. Fig. 2.)

MESEMBRYANTHEMUM PALLENS Ait.

MESEMBRYANTHEMUM pallens; caule diffuso ramisque decumbentibus flexuosis, foliis semiamplexicaulibus distinctis oblongo-lanceolatis acutis recurvato-patentibus perglaucis supra subcanaliculatis subtus costato-carinatis, floribus albis.

M. pallens; caule diffuso, foliis amplexicaulibus distinctis glaucis oblongo-lanceolatis inflexo-concavis obtuse carinatis minute papulosis, calycis lobis 5 ovato-oblongis. DC. Prod. 3. p. 449.

M. expansum. DC. Pl. grass. t. 47.

M. pallens; foliis amplexicaulibus distinctis glaucis oblongo-lanceolatis inflexo-concavis obtuse carinatis; foliolis calycinis ovato-oblongis corolla longioribus. Haw. Revis. p. 168.

M. pallens; foliis glaucis oppositis oblongo-lanceolatis acutis canaliculatis obtuse carinatis. Haw. Miscel. nat. p. 52. — Synop. p. 250. — Ait. Kew. ed. 2. vol. 3. p. 228.

M. pallens; foliis oppositis amplexicaulibus distinctis oblongo-lanceolatis acutis obtuse carinatis: papulis minutis. Ait. Kew. ed. 1. vol. 2. p. 182.

RADIX sublignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS incrassatus, diffusus, decumbens, ramī flexuosi, pedales, adscendentes, teretes, inferne sublignosi, rigidi, cortice suberoso, cinereo, superne herbacei, laevissimi, epapulosis, foliosi.

FOLIA patenti-recurva, in ramulis sterilibus conferta, in floriferis valde remota, juniora triquetra, seniora poll. 2 et ultra longa, et lin. 5 lata, superne et inferne parum attenuata, basi semiamplexicaulia, subdistincta, apice acutiuscula integerrima, supra convexa, medio canaliculatum excavata, subtus carinata costa media valde prominula, pallide viridia, rore glauco obducta, laevissime papulosa, opaca.

FLORES in pedunculo communi epapuloso terminales, ternati aut (pedicellis lateralibus longioribus quandoque bifloris) quini, sed abortu saepe solitarii, ante meridiem expansi. Pedicelli basi bracteati, bracteis foliiformibus parvulis.

CALYX turbinatus epapulosus quadri-aut quinquefidus; laciniis duabus longioribus et latioribus, ante anthesin erectis oppositis, duabus margine membranaceis sub apice mucronatis, quandoque cum tertio intermedio.

PETALA biserialia, linearis-oblonga, apice obtusa, erosula, nivea, longitudine calycis laciniarum majorum.

STAMINA collecta, erecta. Filamenta albida. Antherae flavidae.

PISTILLUM. Ovarium turbinatum, supra convexiusculum. Styli 4-5 subulati, erecto-recurvuli, staminum longitudine.

CAPSULA 4-5 locularis; maturam non vidi.

Habitat in Prom. bon. spei. Floret a mense Julio ad Octobrem.

Observ. Cl. Masson hanc speciem anno 1774 in Angliam advexit. A **M. relaxato** differt caule crassiore superne valde prolifico, foliis fere duplo latioribus recurvatis et laciniis aut lobis calycinis latioribus petalorum albidorum longitudinem adaequantibus.

